

مفيد للنساء والصبيان

بیت القریٰ ۱۰۴
۲۲۰

دہر کی گھر میں موجود ہونا چاہیے

مصنف

ذکر عبد الحکیم خان صاحب ایم۔ بی اسٹنٹ سر جی ریاست پٹیالہ شفا خانہ ناول
مصنف مفید عام۔ ذکر الحکیم۔ رسالہ اعضا منی مخصوصہ و تفسیر سورہ النجم وغیرہ
۱۸۹۹ء مطابق ۱۳۱۵ھ

مطبع حسینی آگرہ پرنٹ ہاؤس علی چھی

قیمت ۳۰/- طبع دوم ۲۰۰۰ - - - محصول لاک -

فہرست ابواب مفید النساء والصبيان

باب اول - ایام حمل میں کیا کیا احتیاط ضروری ہیں۔۔

باب دوم - ایام حمل کے امراض اور اونکا علاج۔

باب سوم - حمل کی شناخت۔

باب چہارم - زایہ اور زچہ خانہ کا بیان۔

باب پنجم - پیدائش کے تین درجہ اور اونکا حاصل انتظام۔

باب ششم - زچہ کی حالت اور اس کی حفاظت۔

باب ہفتم - پیدائش کی غیر معمولی صورتیں اور اونکا انتظام یعنی جوانیہ اور بڑا کسر کا کام۔

باب ہشتم - زچہ کے امراض اور اونکا علاج۔

باب نہم - بچہ کی کیفیت اور اسکی حفاظت۔

باب دہم - بچہ کے امراض اور اونکا علاج۔

باب یازدہم - پیدائش میں زایہ و زچہ ہونا اور اسکا علاج۔

باب دوازدہم - عورتوں کے دیگر امراض کی فہرست اور اونکے علاج کیطریقہ۔

نوٹ - زایہ کے پاس اور بڑے گھروں میں مفصل ذیل اور یہ جو چیزیں بیمار و بیمارین کے لئے مفید ہیں۔

فورا کام سکین اوننا تریاق از اعراق اور وہ مطبوخ و مارگر و ہمدہ شوز کا حال خود مسنونہ ایچکا کسرت و

سفوت اگرک ہم تولہ۔ اگر شراکت دانی برغم پرونی فولیم کلوٹا۔ اولس نکچیر ایوڈین ہم اولس۔ ہمارا

ایسٹم اولس زایہ کے واسطے کچھ ہے۔

کوئین ایک اولس۔ کیسٹر قتل ایک بوتل۔ تارپین ایک بوتل۔ دانی ہم ایچکا کسرت ہم اولس امیر نوک

تھوڈ سے سے صحت کے ساتھ صد ہا غریبوں کی وقت پرانا اور کسکتے ہیں اور بڑا فواید کما سکتے ہیں اس

رسالہ کی ہی بہت سی جلدین خرید کر غریب دوستوں اور عزیزوں میں مفت تقسیم کریں رفعاہ عالم کی

بنیاد اسکی قیمت بھی محض ۳۰ روپے لگی ہوئی ہے۔



۶/۲
۲۰
۷۰۰۵۶

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب اول آیات حمل میں کیا کیا احتیاط ضروری ہیں

جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے جسم پر اپنی پرورش اور نیک بچہ کی پرورش کا ایسا دجا آہر جسکی وجہ سے اس کے ہاضمہ کا درست رہنا اور عودہ غذا کا بھرپور بچھا منانیت ضروری ہوتا ہے جس سے ہر روز زیادہ گزرتے جاتے ہیں اس سے بھرپور بچھتا جاتا ہے اور پیٹ اور پیڈ کے اعصاب اور رگوں پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے جس کی تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے جو تباہی پر عام طور پر حفظ صحت کے واسطے ضروری ہیں اور ان تمام کی پابندی ایام حمل میں خاص طور پر ضروری ہو جاتی ہے اور ان تمام تباہی کا بیان فصل طور پر مریضی عام کی جلد دوم میں لکھا جا چکا ہے۔ کیونکہ غیر عام تباہی دوم صفحہ ۴۴ بیان حفظ صحت کا ہے جو کہ ان تمام تفصیلات کی اس مختصر رسالہ میں کیا پیش نہیں ہو سکتی اسلئے ذیل میں مختصر چند ضروری امر کیطریقہ سے درج کیا جاتی ہے۔

سب سے مقدم ہاضمہ اور اس کے متعلقہ امور کا خیال ہو۔ غذائیں لطیف معوی اور سرخ الہیضہ دینی چاہئیں مثلاً دال پبلکا، شواہ، چاول، کچھڑی، کبیر، فیرنی، پلاؤ، دودھ، بیضہ نیم پخت، ڈیل روٹی، بیگٹ وغیرہ جو چیزیں قابض دیر ہضم اور نفاخ ہیں۔ مثلاً چنا، اروی، باجرہ، تہوا، امرود، پیٹوٹ، جوار، پتھندر، سیم شکر قندی، لکڑی، کپالو، مٹر، موٹہ، مٹوا وغیرہ ان سے حتی المقدور پرہیز لازم ہے اور انامیون

بہت بڑا کئے گئے اور پائے چا دل سب سے عمدہ ہیں۔ زیادہیت بہر کر کھانا سخت ضروری اس سے
 ثقالت نفع اور درد ہو کر بچ کو نقصان پہنچتا ہے کھانے کے وقت غذا کو منہ میں خوب چبانا چاہیئے عجلہ جابر نگلنے
 سے بھی درد اور تشنج معدہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بات کہ نوبت پہنچتی ہے کہ معدہ کے درد سے
 رحم میں بھی درد ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رحم کا درد شدید ہو تو اسقاط تک نوبت پہنچ سکتی ہے۔ موسمی پہلوان میں پوٹ
 لگائی امرود۔ کھیر لڑا اور شکر قدسی سے پرہیز رکھنا چاہیئے کچے پھل وغیرہ نہیں اور دیہ بنیہ ہوتے ہیں
 لیکن بچے ہو سے سبب۔ ناسپاتی۔ انگور۔ بیر۔ سنگتہ۔ لیون۔ کبجور۔ خربوزہ۔ آب اور ان کا تھوڑی
 مقدار میں کوئی مضائقہ نہیں اور دودھ اور دودھ کی کچی لہسی نہایت عمدہ چیز ہے۔ گھی اور مکین کا مناسب
 مقدار میں استعمال ضروری ہے زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مغیاب میں غذا کا بیان۔ اس جگہ ہر ایک
 غذا کی نسبت مفصل طور پر ظاہر کر دیا گیا ہے کہ کس قدر دیر میں کھنکھرتی اور ایک چھٹانک کھانے سے کتنا
 ملاقت پیدا کرتی اور اس میں فیصدی پانی کتنا اور غذائیت کتنا اور اگر قبض کی شکایت رہتی ہو تو کبھی
 کبھی کسٹہ اٹل۔ دو تولہ تین چار صغہ گرم دودھ میں ملا کر پی لینا چاہیئے تیر حلا بون سے حل کے گرجائے کا اندیشہ
 ہوتا ہے اگر دینے قبض رہتا ہو تو اس کے واسطے چکا ہوا رائڈ خربوزہ سب سے عمدہ چیز ہے۔ ایک سرسج الہضم معوی
 غذا ہیں ہوا و قبض کشا دوا بھی اور مٹی ہلیدہ ایک دودھ دوسو تے وقت دودھ کے ساتھ کھا لینا یا گلقد
 ہر تولہ کھانا بھی مفع قبض دایمی کے واسطے مفید ہیں۔ قبض دایمی سے صدمات حرکات نقصانات اور ظرات
 کا اندیشہ ہوتا ہے اس لئے اس کی طاعت خاص توجہ رکھنی چاہیئے خاص کر پیدائش کے وقت قبض سے سخت
 وقت ہونی چاہئے کہ اس سے پیدائش کے راستہ میں روک اور تنگی ہو کر بچ کا پلیدہ میں اور نامحال ہو جاتا ہے
 غذا کے پورے طور پر ہضم ہونے اور تحلیل فضلات کے واسطے مناسب ورزش نہایت ضروری ہے
 غریب عورتیں جو اپنے گھر کا کاروبار خود کرتی ہیں اونکا ہاضمہ درست رہتا ہو تمام فضلات خوب تحلیل ہوتے ہیں
 اور جسم قوی اور تندرست بنا رہتا ہے اسلئے اونکی اولاد بھی قوی اور تندرست پیدا ہوتی ہے اور جنفے کے وقت
 کچھ تحلیل نہیں ہوتی۔ لیکن امیر گھروں کی عورتوں بچہ ایک بڑی آفت ہے کہ اور تو کسی قسم کی ورزش و رکنا
 گھر کا معمولی کاروبار بھی بیٹھے بٹھائے اور دن سے کرا لیا جاتا ہے۔ خالی بیٹھے یا پڑے رہنے کو آرام سمجھتی

ہین اس سے اونکا جسم بوجھا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ کوئی غذا کیسی ہی عمدہ اور معوی ہو بہت کم گنتی یعنی موثر نہیں ہوتی جتنے وقت سخت تکلیف اور ہٹائی پڑتی ہے اور اولاد بھی کمزور اور روگی پیدا ہوتی ہے۔ ایتھم صلب اور نیز جھنے کے بعد خطرہ طبع کے امراض دامنگیر ہو جاتے ہیں جو خراب فضلات اچھی طرح خارج نہیں ہو سکے وہ مان اور بچہ دونوں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں رحم کمزور ہو کر پیدائش کے وقت ناکارہ ہو جاتا ہے اور بچہ بڑی دیر میں اور سخت مصیبت سے پیدا ہوتا ہے زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو بیان ریاضت کا مفید عام مین۔

مرد و عورت کے باہمی تعلقات اور جماع کے بارہ مین صدمہ طبع کے فتور و زبر و زبیر زیادہ ہوتے جاتے ہیں جنکی وجہ سے حاملہ اور بچہ کو خراب امراض کا شکار بننا پڑتا ہے اولاد ناقص کمزور کم عقل اور دائم المریض پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جس قدر بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں اکثر مریض ہوتے رہتے ہیں فی الحقیقت والدین اپنی غلطیوں اور بجا حرکات سے ان کی ہلاکت کا باعث ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص یہی اکثر جماع کی بھول سے پیدا ہوتا ہے جماع کے قواعد اور اس کے متعلقہ مریضوں کا بیکار مفضل طور پر مفید عام اور سارا اعضائے مخصوصہ مین کر چکے ہیں۔ پس دیکھو جماع کا بیان مفید عام یا سارا اعضائے مخصوصہ مین۔

کپڑوں مین یہ اعتدال رکھنا چاہیئے کہ سردی سے کافی حفاظت رہے۔ اگر بدن کو سردی لگتی ہے تو اس سے پسینہ نکل جائیگا۔ پسینہ کے ساتھ ایک قسم کا حیوانی زہر خارج ہوتا ہے جو پسینہ کی کمی سے بندر بکران مین تشنج کا مرض پیدا کر سکتا ہے جس سے ہلاکت تک نوبت پہنچ جاتی ہے بچہ کی صحت کو بھی اس سے سخت نقصان پہنچتا ہے بارش مین اس مین بھیگنا یا میلے کچیلے کپڑے پہنا یا بدن کو غلیظ رکھنا بھی پسینہ کو روکتا ہے۔ حمل و عورت کے واسطے ہمیشہ نیک گرم پانی سے نہانا نہایت ضروری ہے اس سے جلد صاف رہ کر پسینہ بخوبی خارج ہوتا رہتا ہے زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام مین باہر کا بیان اس مین سونا یا بھیگے ہوئے کپڑے پہنا بھی پسینہ کو روک کر سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہی زہر جو پسینہ کے ساتھ خارج ہوتا ہے پیشاب کے ساتھ بھی خارج ہوتا ہے اسلئے حاملہ کو کافی مقدار مین پیشاب آتے رہنا بھی نہایت ضروری ہے ٹھنڈا پانی یا دھواں کی کچی ٹہنی یا سوڈا یا اثریارت کا پانی یا کوئی ٹھنڈا مٹی کا فی مقدار مین روزانہ پیتے رہنا چاہیئے اس سے پیشاب اور پسینہ بخوبی خارج ہوتے ہیں اگر جسم کا زہر یا یعنی حیوانی زہر صاف ہوتا ہے تو بھیگنا۔ پسینہ اور پیشاب

کی کمی سے جو شے پیدا ہوتے ہیں یہ کہیں تو آیام ہل بن کر ہر پر جاتے ہیں اور کہیں پیدائش کے
 وقت اور کہیں پیدائش کے بعد یہ آئینہ سخت مملکت میں ہوا کو تمام الناس اس سبب خیال کر کے
 گندے تو زمین پر جاتے اور باقاعدہ علاج نہیں کراتے ہیں جس کا نتیجہ عوامی ہلاکت ہوتا ہو کچھ روکے
 آسام اور ان کے علیحدہ علیحدہ اس کا بیان مفید نام میں منسلک ہے جو کہ پڑھ کر یہ مفید عام میں بیان
 ایسا ہے کہ کبھی تازی ہو جائے اس کے واسطے غبارت نہ رہی ہو کہ نہ پیتے نہ کھاتے نہ شہ کی وجہ سے اس
 کھینچ کر آتا اور جو یہ ہے اس کے ساتھ بہت علاج ہوتے ہیں کہ یہ بیان نفس کا مفید عام میں۔
 زیادہ محنت و زحمت اور گفتگو اس کے حامل کو پہچانا چاہیے زیادہ بوجھ اٹھانے سے کر کے بہانے و ڈرنا
 اور زمین پر بار بار چڑھنے اور نہلنے سے اسقاط کا اندیشہ ہوتا ہو۔ خاص کر پہلے تین ماہ میں اسقاط عینا پہلے
 تین ہفتوں میں ہی ہوتے ہیں کیونکہ تین مہینے تک جنین پوری مضبوطی کے ساتھ رحم کے اندر پوسٹ
 نہیں ہوتا اسلئے زیادہ حرکت نہ کر یا صدمہ یا اچانک خوف سے اوکھڑ کر گرنے شروع ہو جاتا ہو کوئی صدمہ یا خوف
 کی بات حامل کو دفعتاً جنین سنائی چاہیے۔ اندھیرے میں اکیلے پھرنے سے بھی بچنا لازم ہو کہ
 اس میں ٹھوکر کھانے یا اچانک ڈر جائیگا احتمال ہر جس سے اسقاط حمل ہو سکتا ہے۔ یہ تین مہینے کے بعد جبکہ
 جنین بچنے طور پر رحم میں قابض ہو جاتا اور سب سب کرنے اور دیگر رکات سے چند ان اندیشہ نہیں رہتا یا پھر جن
 مہینے کے بعد بھی دور کا سفر کرنا اور پیدائش کے قریب بوجھ اٹھانا اور محنت اور تردد کا کام کرنا جائز
 نہیں درجہ قبل از وقت بچہ کی پیدائش شروع ہو جائیگی۔ عمل کے دن ۲۷ شمار کئے گئے ہیں یعنی اگر تمام
 مہینے ۳۰ دن کے ہوں تو ۹ مہینے اور آٹھ دن مدت حمل ہوگی۔ اس کے شمار کا یہ طریقہ ہے کہ جس روز سے کچھ
 بند ہوں اور ہر روز سے ۹ مہینے انگریزی شمار کر کے تین دن زیادہ کرو جو تاریخ شمار میں آوے وہی تاریخ
 پیدائش کی تاریخ ہوگی اس میں چار یا پانچ یوم کی کمی بیشی اکثر ہوجاتی ہو مگر زیادہ نہیں اس لئے ہر حاملہ کو
 اپنے آخری کپڑے بند ہونے کی تاریخ ضرور یاد رکھنی چاہیے تاکہ وقت پر طیارہ سکے چونکہ فوری مہینہ
 ۲۸ دن کا ہوتا ہے اسلئے اگر فوری تاریخ میں شمار ہو تو دو دن اور بڑھانے چاہئیں اگر چاند کے مہینے کا
 شمار کیا گیا ہو تو مہینے بارہ یوم کا شمار کرنا چاہیے *

بعض عورتوں کو ایام زیادہ متقدار میں اور زیادہ دنوں تک آتے ہیں ایسی عورتوں کو اپنے ایام کے دن یا دو رکھنے چاہئیں اور ایسے ایام میں چلنے پھرنے اور ہر قسم کی محنت اور تردد سے بچنا چاہیے ورنہ خون جاری ہو کر حمل گر جائیگا۔ اس لیے احتیاطی اور بے خبری سے اکثر عورتوں کے حمل بار بار گرتے رہتے ہیں اور عورتوں کو بھی اپنے ایام کے دنوں میں کسی قدر احتیاط ضروری ہے حالہ عورتوں کو دینی مرضی والوں کے پاس ہرگز نجانا چاہیے ورنہ اس کو یا اس کے بچہ کو وہی مرض لگتا ہے اور دنوں ہلاک ہو جاتے ہیں۔

بیمار کی خسرو - چولا - گنڈھی - موتی جہار - ہبہ - سل - تہ - تھرتہ - ماشہ - سرخ باد مقدسی امراض میں جو چھوٹے حملہ اور اس کے بچہ کو بہت جلد پڑ سکتے ہیں ایسے مریضوں کے شرب اس کو ہرگز نہ کرنا چاہیے زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو بیان ان امراض کا مفید نام میں اگر کسی کسی شکم پر پکھنچ اور درد معلوم ہو یا پستان میں درد ہو تو تاریل کا تیل یا گوبی گرم کر کے اس کی ماش کو زیادہ سفید ثابت ہوا ہو - اگر بیٹ زیادہ اٹکا ہوا ہو تو کچڑا یا نہ کر - ہمارا دیا جا رہا ہے لیکن پیشہ کو زیادہ کھینچنا یا نہ دھنا یا آزار بند پید سے اوپر کھینچنا مضرب ہے۔ یورپ کی عورتیں جزیٹ کو کس کر باندھتی ہیں یہ ایام حمل کے لئے سخت مضرب ہے اس سے رحم کے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں اگر صبح کے وقت جی متلاتا ہو تو اوٹھنے سے پیشہ کچھ کھا لیتا چاہیے عموماً خالی معدہ کے ساتھ پانی پر سے اوٹھنا مسئلہ کا باعث ہوتا ہو مگر جو چیز کھائی جاوے وہ ثقیل اور نفاخ نہ ہو مثلاً دودھ - کھچڑی - تازہ گوشت کا پھلکا اور دال - دلیا - بکٹ - ڈبل روٹی اور دودھ چاول وغیرہ ان میں سے جو آسانی میسر آ سکے اور موافق ہو استعمال کر ان میں - اگر سوزے ہو کہ معلوم ہو تو تب ہی ہمیشہ ایسی ہی زود ہضم شے یا مین سے کچھ کھا دینا چاہیے یہ ایک سخت غلطی ہے کہ ایام حمل میں جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج نہیں کرایا جاتا اطباء علاج کرتے ہوئے اسقاط کا خون کرتے ہیں اور عموماً حاملہ کا علاج دایمیں بوڑھی عورتوں اور سیانوں پر چڑھتے ہیں اور اکثر امراض کو بہت پریت اور آسیب خیال کر بیٹھتے ہیں فی الحقیقت تمام بہت چڑیل تو ہیں مین سست بیٹھے یا پڑے رہنا کوئی کام نہ کرنا - زیادہ کھانا - زیادہ سونا اناج - شناپ چولے کی مٹی - شکر یاں - گوند - گیرو - گاجنی اور مٹی کھاتے رہنا - میلے کھیلے اور مٹے ہوئے کپڑے پہنے رہنا بدن کو صاف نہ رکھنا - سرد اور مرطوب ہواؤں سے کافی حفاظت نہ کرنا - پاخانہ پیشاب

اور پسینہ کا خیال نہ رکھنا۔ باضمہ خراب اور پسینہ و پشیمانی بند رہنا کپڑوں کے آداب میں احتیاط نہ رکھنا جو اہم
موجود ہوں اور کھانا سب علاج نہ کرتا چھوٹ کے مضمون سے نہ بچنا۔ جماع اور حرکت و سکون میں اعتدال
نہ رکھنا جب کوئی خرابی ہو جائے اوس کا مناسب علاج نہ کرنا۔ اگر یہ پوشی یا تشنج یا غشی یا نذران یا خلل و خلل
کسی مرض سے ہو جائے اوسکو آسب خیال کر لینا اور ڈاکٹر کا علاج نہ کرانا الغرض یہ تمام بہت اپنی ہی
پر توفی اور جہالت سے بشت ہین جو اکثر درجن اور پچو کو ہلاک کر ڈالتے ہین اب ہم آئندہ باب میں اور امراض
کا علاج غرض سے درج کرتے ہین جو آیام دل میں پیدا ہوتے ہین زیادہ تفصیل کیلئے مضمون میں آئی امراض کے بیان
باب دوم آیام عمل کے امراض اور اونکا علاج

۱۱۱ نمونہ اور تھے ہونا یہ من نمونہ اور سر سے مہینے میں مشرق ہو کر چوتھے مہینے تک رہتا ہے بعض
سورتوں میں بہت نفیست ہوتا ہے کہ کچھ تکلیف نہیں معلوم ہوتی لیکن بعض میں ایسا شدید ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ
پانی کا بھی ہضم نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ایسی حالت میں کہی اسقاط ہو کر نجات ملتی ہے اور کہی حاملہ خود
ہلاک ہو جاتی ہے خفیف حالتوں میں مہل اسی قدر علاج کافی ہے کہ صبح اوٹھنے سے پیشتر مر بعد کو قدرے
گرم دودھ یا دلیا یا چاول یا کچھ پھری یا دال پہلکا کھلا دیا جائے کہ اس سے متلی بہت کم ہو جائیگی
کمٹی کے سٹو یا کمٹی کا دلیا کھلا سب سے عمدہ ہے سخت سے سخت حالتوں میں ہی اس سے آرام ہو جاتا ہے
ایک دفعہ میں بہت سی انگیزی اور یونانی ادویہ آزمائی گئی مگر کوئی صورت تخفیف پیدا نہ ہوئی ریات روز
تک باہر تھے ہولی تری کوئی کہا نے پینے کی چیز ایک منٹ کے واسطے ہی مدد میں نہ رہ سکی اور سخت
مالیسی کی حالت پیدا ہو گئی آخر بیمار کمٹی کے ستو پانی میں کھو کر اور قدرے شکر ملا کر کھلائے گئے وہ ہضم
ہو گئے اور اوسیکہ بعد ہضم نے پانی کو کثرت بیا کر نہ کثرت روز سے پیاسی تھی تمام پانی ہضم ہو گیا اور بعد
اذان معمولی غذا ہی ہضم ہونے لگ گئی مگر دن کی پشت پر بہت ملنا اور معدہ کے مقام پر سرخ مریج
اور نکلی چٹنی کا لپ کرنا ہی مفید ہو۔ تمام علاجوں میں سب سے بڑھ کر کمٹی کے ستو یا دلیا کھانا آج
اگر اس سے آرام نہ ہو تو اور ادویات آزمائی جائیں تمام پیٹ پر گیر و مٹی کا لپ کرنا بھی مفید ہے
زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو فیصلہ جلد اول صفحہ ۲۱۲ اگر کسی دوا سے تھک نہ ہو اور توت

مربعہ نایل ہوتی جادے تو اسقاط کر دینا چاہیے اسقاط کرانے کی سب سے آسان اور عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چار رتی دار چکنا ایک سیر بخت پانی میں ایک مٹی کے برتن میں گھول کر اس سے خوب ہاتھ دھو کر دھولین بعد ازاں گرم کیا ہوا تیل ایک انگشت پر لگا کر رحم تک پہنچا دیں اور رحم کا منہ معلوم کر کے اس کے اندر لٹیکلی حائل کرین بعد ازاں اس انگلی کی مدد سے ایک ربڑ کی ٹکلی چار پانچ انچ تک رحم کے اندر پہنچا دیں اس کی مدد سے دو تین گھنٹے کے اندر رحم کو تحریک ہو کر پیدائش شروع ہو جاتی ہے اور بلا کسی اور تدبیر کے جنین باہر آجاتا ہے زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام میں ابارشن کا بیان صفحہ ۵۳۲ (۲) قبض۔ اگر کبھی کبھی ہو تو کیکرٹائل ۲ تولہ گرم گرم دودھ میں ملا کر پلا دینا چاہیے۔ دایمی قبض کیلئے پکا ہوا ارٹھر پورہ کھاتے رہنا سب سے عمدہ دوا جس کا پہل بھی ہر موسم میں منسکنا ہو ایک ڈویٹر گھر کے قریب لگا رکھنے چاہئیں اگر یہ موجود نہ ہو تو مربی ہلیلہ دو تین عدد گرم دودھ کے ساتھ کبھی کبھی کھاتے رہنا مفید ہو سکے۔

(۳) اسمہال یعنی مست آنا۔ لطیف سرخ الہفم غذا کھلائیں اور مفصلہ ذیل نسخہ میں سے کوئی ایک نسخہ استعمال کریں (۱) رومی مصطلی ایک تولہ۔ مصری ۸ تولہ۔ املو بار یک پیکر ایک ایک تولہ خیراک میں تین چکر دفعہ روزانہ کھلائیں (۲) اندر جو ۴ تولہ۔ دارچینی ۴ تولہ۔ زعفران ۴ ماش۔ کہر لہ مٹی ایک تولہ۔ مصری ۵ چھٹیک۔ خوراک ۴ ماش تین دفعہ روزانہ (۳) چاک پوڈر ۱۰ رتی تین دفعہ روزانہ اس کے بانی کی کھانا صحت ذیل ہے۔ دارچینی ۴ حصہ۔ جانیفل ۳ حصہ۔ زعفران ۲ حصہ۔ لونگ ڈیڑھ حصہ۔ چھوٹی الائچی کے دانہ ایک حصہ۔ صاف سفید بورہ ۲۵ حصہ۔ سب ادویہ کو علیحدہ علیحدہ خوب بار یک پیکر اور چھانکر باہم ملا لیں بعد ازاں کل ادویہ کا تیسرا حصہ صاف کھر یا مٹی بار یک پیکر ملا لیں اور ایک صاف بوتل میں ڈال کر ڈاٹ لگا کر کچھ چوڑی بن جب اسکو کپاؤنگ کرنا ہو تو پھالیا سو ان حصہ افیون (نہی ملا لیں) (۴) بسمیہ بنائیں (۵) ۳ رتی۔ گیلک ایڈ ۲ رتی۔ ایسی تین خوراک روزانہ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام میں اسمہال کا بیان۔

(۴) بقیہ مٹی۔ اگر بیک گرم لگتی ہو تو مفصلہ ذیل نسخہ کھلائیں۔ اجوائن ۶ ماش۔ سولہ ایک تولہ۔ نمک لاہوری ایک تولہ۔

نوشاد و ایک تولہ ۱۰ لاجی خورد ۶ ماشہ ان ۱۰ ب کو ایک پیسک سنفوف تیار کر لین خوراک ۲۰ ماشہ ہر دو وقت
 کھا شیتہ نصف گھنٹہ پیشہ اگر کھانے کے بعد بوجہ معلوم ہوتا اور نفع ہو یا نہ ہو تو حسب ذیل علاج کریں
 کچا ٹیکے ہوں تو اسارا چار لیون یا پانز یا اورک یا آئینہ کا چوکر مین ڈالا گیا ہو کھلا دیا کریں مگر عادت
 کے طور پر اچار کھانا سخت منہ سے گندہ کا ترش اور پینٹ پلانا بھی نہایت مفید ہے اگر سرکین قدرے
 نمک ملا کر پلا دیا جائے وہ بھی مفید ہو سکتا ہے زیادہ تفصیل کیلئے دیکھو مفید عام میں بد منہی کا بیان

(۵) بوسیر - گنگنہ یا ارڈوز بوزہ یا مربی ملیا ہے رنج قبض کرتے ہیں اور ساندہی ماز و اور انیون کامر ہم ہو
 پر لگا دیں اس مہم کی ترکیب حسب ذیل ہوتا انیون ۱ تولہ - بازو ۲ تولہ - کسٹن ۳ تولہ

(۶) اگر خون ریتیں ہو کر چہرہ کارنگ ہو یا چڑھاوے اور عام ضعف غالب رہے تو عمدہ غذاؤں مثلاً دودھ
 مکین - بریفنیم برشت اور پلاؤ وغیرہ کے علاوہ خوشگوار موسمی پھل مثل سیب - اسبانی انگور کشمش - انار -
 لوکاٹ وغیرہ توڑی مقدار میں کھا دیں اور مفصل ذیل نسخہ بھی دیتے رہیں ہیر کرکیس نصت رتی -

ریورہ چینی ایک تہ عرق ایک رقیق عری میں گولیان بنا کر دو گولی روزانہ کھانے کے بعد دیتے
 رہیں اگر خون زیادہ ریتیں ہو کر چہرہ یا پاؤں پر صبح نمایاں ہو تو عذرات استعمال گرائین مثلاً قلمی شورو
 ۶ ماشہ خارشک ۶ ماشہ چوب چینی ۶ ماشہ - مصری ۳ تولہ انکی ہینکی بنا کر ماش خوراک میں میں وقت

روزانہ دین یا سنخ ذیل پلاوین - ٹیکر چیری ٹیکس ۵ ہونڈ - ٹیکر قیری پر کلورائیڈ ہونڈ - پانی ایک اونس
 ایسی دو خوراک روزانہ کھانے کے بعد زیادہ تفصیل کیلئے دیکھو مفید عام میں انڈیا کلیدیان

(۷) دل کا پھر کھانا مربی سیب اور چاندی کے ورق کھلاوین مرلیفہ کو چیت لٹائے رکھیں اگر خون پستلا
 پڑ گیا ہو تو اسکا علاج کرتے رہیں جیسا کہ فیروز میں بیان کیا گیا -

(۸) غشی ہو جائے - فوراً نوشاد روچہ ہونز ایک شیشی میں ڈالکر اور اس میں پانی ملا کر سنگھا دیں
 جب ہوش میں آوے تو مربی سیب اور چاندی کا ورق کھلاوین - نوشاد اور چونہ کی شیشی بند
 کر کے بکھ چھوڑیں تاکہ وقت پڑے تو کارآمد ہو سکے -

(۹) ٹانگوں کی رگوں کا پھول جانا - مضبوط جمل میں پہنا کر ٹانگوں پر پٹی باندھیں رکھیں -

(۱۰) پیشاب کار کا رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رحم چھری پول کو دبا لیتا ہو اس لئے رحم کو دو انگشت کے ساتھ اوپر کی طرف اور مٹا دین بعد از ان پیشاب خود بخود آ جاوے گا ورنہ ایک سر پڑ یا چاندی کی نعلی پیشاب کے راستہ میں داخل کر کے پیشاب نکال لین اس عمل کو عورت خود یا سانی کر سکتی ہے۔

(۱۱) اندام نہانی پر کھلی ہونا۔ کافر اور آئینوں ہوزن پانی میں حل کر کے لیپ کریں اور پھٹکی و مابشہ ایک سیڑھی پانی میں حل کر کے اس سے دھو لے رہیں۔

(۱۲) بے خوابی۔ روغن کاہو سر میں ملین اور نیر سنگھاوین زیادہ تفصیل کیا سٹے دیکھو مفید عام۔

(۱۳) فالج۔ یہ مرض حمل کے بعد خود بخود رفع ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کی خرابیوں سے خون زہریلہ ہو گیا ہے اور فالج کے ساتھ علامات بہک اور بیہوشی بھی موجود ہیں چہرہ اور پاؤں پر درم ہر سخت بے چینی اور بے خوابی رہتی ہے تو اسقاط کر دینا چاہیئے۔

(۱۴) چہرہ۔ سر پرستان یا دیگر حصوں میں درد ہوتا۔ اس کا سب سے عمدہ علاج حسب ذیل ہے۔ نو شاد درم تو جو آہن ایک تو لہرست گلو ایک تو لہر خراک ۲۰ مشہر تین دفعہ روزانہ پانی کے ساتھ۔ کوئین بھی مفید ہے۔ ۱۵ رشتہ۔ یہ رقت خون کی وجہ سے ہوتا ہے اسلئے ستوی خون اووہ جیلا کہ نمبر ۱۰ میں بیان کیا گیا ہے کہ کلاوین۔ مفصلہ ذیل نسخہ مفید ہے۔ کوئین بہرہ رمانہ ۵ گرین۔ لائیکوارا رسنگ ۳۰ بوند سپرٹ کلوروفورم ۱۵ بوند پانی ایک ونس ایسی دو خراک روزانہ کھانے کے بعد

(۱۶) رحم کا آگے پیچھے کی طرف گریزنا۔ یا زخم کھانا۔ جب رحم آگے یا پیچھے کی طرف گریزنا ہو یا زخم کھانا ہو۔ تو پیشاب بار بار آتا اور کبھی ترک جاتا ہے یا خانہ کی بار بار حاجت ہوتی اور اکثر قہقہہ رہتا ہے چلنے پھرنے میں تکلیف معلوم ہوتی ہے کہی رحم پیچھے کی طرف گریزنا ان امراض کی پہچان ڈاکٹری کر سکتا ہے جب اس قسم کی علامات پیدا ہوں تو ضرور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیئے زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام میں رحم کے امراض کا بیان۔

۱۷ پیڈو کے جراثیم کا ڈبیر پلا پڑ کر چلنے پھرنے میں وقت اور تکلیف ہونا۔ پیڈو کے گرد ایک مضبوط بیٹی یا پگڈنڈا دینا چاہیئے۔

(۱۸) سفیدی بکثرت آتا۔ بدن کو مفصلہ ذیل پانی کیساتھ دو تین دفعہ روزانہ صاف کرنا چاہیئے بھنگی کی
۶ ماشہ پانی ایک سیہ پختہ ۷

(۱۹) جنون اور تشنج۔ جب یہ امراض پیدا ہو جائیں تو نہایت وقت کے علاج پذیر ہوتے ہیں جیسا کہ
پہلے باب میں ذکر کیا گیا ہے اگر پورے طور پر باخاندہ پیشاب پسینہ اور تنفس کی طرف نظر رکھی جاوے
اور اگر ان میں کسی قسم کی روک یا کمی واقع ہو اسکا فوراً دفعہ کر دیا جاوے تو زہر یونہی یا نہیں سے یہ
امراض پیدا ہوتے ہیں صاف ہوتا رہتا ہے اور یہ امراض رک جاتے ہیں غضب تو یہ ہے کہ ان امراض
کے قبل از وقت کوئی روک نہیں کی جاتی اور جب جنون اور تشنج کی علامات ظاہر ہوں تو اونکو بہت
چڑیل بنا کر مرینہ کو دانستہ اناڑیوں کے ہاتھ سے مروا دیا جاتا ہے۔

ان امراض کا علاج ہم زچہ کے امراض میں درج کر کے انشاء اللہ تعالیٰ

(۲۰) رحم کے اندر۔ سے کہیں کہیں پانی خارج ہوتا۔ یہ مرض حل کے تیسرے مہینے میں شروع ہو کر اخیر تک
رہتا ہے مرینہ اس سے ہر اسان ہو جاتی ہے۔ مگر فی الحقیقت اس کا کچھ اندیشہ نہیں۔ لیکن اگر پانی کو
نکلنے کے ساتھ درد بھی اوٹھے اور نرم رحم کشادہ ہو جائے تو خیال کرنا چاہیئے کہ اسقاط ہو گیا ہے۔
اس کا اسقاط کرنا چاہیئے دیکھو بیان اسقاط کا نمبر ذیل یعنی ۲۱مین

(۲۱) حمل گر جانا۔ اسقاط۔ جن عورتوں کو گرمی کا دکھ ہوتا ہو اس کے حل اکثر گرتے رہتے ہیں اس لئے
گرمی کا علاج مرکبات پارہ اور پچاسیم آکسائیڈ سے کرنا چاہیئے۔ گرمی کا علاج انشک میں ہوتا
عدوگی اور تفصیل کے ساتھ مرینہ عام اور سالہ اعصاب کے مخصوصہ میں درج کیا جا چکا ہے لیکن ان
کتا بکو دیکھو جب تک گرمی کا علاج نہ کیا جائیگا اس وقت تک حل قائم نہ رہیگا۔ بعض عورتوں کو بلغمی
خاص وجہ کے ایک خاص مہینہ میں حمل گر جانے کی عادت ہو جاتی ہے اگر تحقیق سے یہ معلوم
ہو کہ وہ دن کپڑے ہوتے ہیں تو ہر مہینہ کے مہینہ جب وہ دن آوین تو مرینہ کو نہایت آرام سے
لیٹے رہنا چاہیئے بعض عورتوں کے بچے ایک خاص مہینہ میں پریٹ کے اندر گر کر جاتے ہیں۔
اگر ساتویں مہینے کے بعد ایسا ہوتا ہو تو اسقاط کے دلائل سے ایک دو مہینہ پیشتر پیدائش

کرالین چاہیے کیونکہ سات مہینے سے اوپر بچہ کے بچنے کی امید ہو سکتی ہو۔ آئندہ کو اس عادت سے بچنے کا یہ علاج ہو کہ عورت اپنے خاوند سے ایک دو سال علیحدہ رہے تاکہ رحم کی سابقہ عادت ٹوٹ جائے پھر جو حمل ہوگا وہ نہیں گرے گا۔ اگر خون تھوڑی مقدار میں خارج ہو اور رحم کا مہر بھی نہیں کھلا تو گرنا بند ہو سکتا ہو اور کسی تدبیر نہ ہو کہ مریضہ کو فوراً آرام سے لٹا دین چنڈ روڑ کیواسطے چلتا پھرتا بند کر دین اور ایفون ایکے تی دو دفعہ روزانہ کھلاتے رہیں اس سے حمل قائم رہے گا۔ دای برنم پرونی فولیم ایک انگریزی دوا ہے جو اسقاط کے روکنے میں نہایت قوی الاثر اور مخرب ہوا اسکے ترک کر ڈیکٹ کے ۳۰ قطرہ نصف چھٹاناک پانی میں ملا کر تین تین گھنٹے کے بعد پلاتا اسقاط کو روک دیتا ہے جن مریضوں کا حمل گر جاتا ہو اور کو یہ دوا ضرور اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اگر خون زیادہ مقدار میں خارج ہو رہا ہو اور رحم کا مہر بھی کھل گیا ہو تو اسقاط کا روکنا ہی ہو اور وقت بھی اس کو شش کر ہی چاہیے کہ جلدی سے اسقاط ہو کر جریان خون و غیرہ سے نجات مل جائے اور کسی آساق ترکیب یہ ہو کہ ایک انغلی رحم کے اندر داخل کر کے جنین کو چھڑی دین اپنی جگہ سے جنین ہلکے جلدی باہر آجاتا ہو اسقاط کے بعد مریضہ کو کم از کم دس روز تک آرام سے لٹا رکھیں اور غذائیں لطیف اور مقوی دیتے ہیں یہ بڑی خوفناک غلطی ہے کہ اسقاط کے بعد مریضہ کی پوری خبر داری نہیں کی جاتی اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے واسطے رحم میں طر حصر کے امراض جیگرہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر حمل ہمیشہ گرتے رہتے ہیں بعض امراض ایسے ہو جاتے ہیں کہ عورت حاملہ ہی نہیں ہو سکتی جب قدر پوری پیدائش کے بعد زچہ کا احتیاط کیا جاتا ہو اسقدر اسقاط کے بعد ہونا چاہیے بلکہ اس سے بھی کس قدر زیادہ یہ بات قابل یادداشت ہے۔ زیادہ تفصیل کیلئے دیکھو مفتی علی محمد اور رسالہ اعصابہ میں بالبرتن کا بیان۔

باب سوم حمل کی شناخت

۱۔ حیض کا بند ہونا۔ حمل کے بعد حیض ہمیشہ بند رہتا ہو۔ بعض اوقات بیماری سے بھی ایسا ہو جاتا کہ کبھی باوجود حمل قائم ہونے کے پہلے تین مہینوں میں ایام کے دوان میں خون آتا رہتا ہو اسلئے یہ قطعی علامت نہیں ہے۔

۲۔ پستان کا بڑھنا اور چھپنے کے گرد سیاہ چمکنا یا لہجہ ہونا تدبیر سے چھپنے کے بعد دبا سنے سے دور

نکلنا کہی بیماری سے ایسا ہو جاتا ہو۔ کہی حمل کی حالت میں بھی پستان چوٹی پر بھجائی ہین۔ گویا کریمہ قطعی علامت نہیں ہو۔

(۳) بچہ کی حرکات معلوم ہونا۔ حمل کے سواہین ہفتہ میں بچہ بہتر معلوم ہوتا ہو پہلے پہل اوسکی حرکتیں بہت خفیف ہوتی ہیں لیکن بعد میں زیادہ تیز اور قوی ہو کر صاف لائق مارتا معلوم ہوتا ہو۔ بعض اوقات یہ حرکات ہفتوں اور مہینوں بند ہی رہتی ہیں اور کہی کل مدت حمل تک بالکل معلوم ہی نہیں ہوتیں۔

(۴) رحم کا کہی کہی سکڑنا اور سخت ہو جانا۔ شکم پر ہاتھ رکھنے سے رحم کا سکڑنا اور سخت ہونا کہی کہی معلوم ہوا کرتا ہو۔ اگر رحم کے اندر رسولی ہو تب ہی ایسا معلوم ہوا کرتا ہو۔

(۵) صبح کے وقت ہی تھلانا اور تھوڑے ہونا۔ واسیات چیزوں کے کھانے کو دل چاہتا۔

(۶) غم رحم کا نرم ہو جانا۔ اندام بنائی کی رنگت نیلی پڑ جانی۔ غم رحم کے اندر نگلی داخل کر کے اگر اوپر کو دھکیلا جاوے تو بچہ اوپر کو اوچھل کر پھرا نگلی پر اڑتا ہو یہ ایک صاف علامت ہے۔ کیونکہ رسولی اس طرح اوچھل کر انگلی پر نہیں اڑ سکتی۔

۷۔ بچہ کے قلب کی آواز میں سستانی دینا۔ بچہ کا دل فی منٹ ۱۲۰ دفعہ پھڑکاتا ہو اور اتنی ہی دفعہ گھڑی کی آواز کے مشابہ دوسری آواز میں سستانی دیتی ہیں یہ ایک یقینی علامت ہے حمل کے جو تھے اور پانچویں مہینے میں یہ آواز میں پہلے پہل سستانی دیا کرتی ہیں جب یہ آواز میں سستی جائے تب حمل میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ان آوازوں کو مان کی ناف کے نیچے پیڑ کے مختلف حصوں پر کان لگا کر سن سکتے ہیں۔

۸۔ ناف کے نیچے کان لگانے سے سائیں سائیں کی آواز میں سستانی دینا۔

۹۔ پیٹ کا تدریج بڑھتے جانا۔ اور رحم کا پیٹ میں معلوم ہونا۔ میسرے مہینے کے بعد رحم پیڑ سے اوچھل کر معلوم ہو سکتا ہو۔ پانچویں مہینے میں ناف اور کاسے بالوں کے درمیان ساتویں مہینے میں ناف پر اٹھویں مہینے میں ناف اور کوڈی کے درمیان اور نوین مہینے میں کوڈی پر۔ کوئی رسولی نہیں

ہموار رفتار سے ہمیں تیرہتی۔ اسلئے پیٹ کا بند بچ چھنا ہی ایک صاف علامت ہے۔

یہ حمل کی علامات ہیں جو بیان کی گئی ان تمام کے مطابق خود کرتے سے قطعی طور پر رائے قائم کیجا سکتی ہو کہ حمل موجود ہو یا نہیں۔ کسی ایک علامت کو دیکھ کر حمل کی رائے قائم کر لینا سخت غلطی ہو۔

باب چہارم دایہ اور زچہ خانہ کا بیان

دایہ کو زچہ کے کمرہ میں داخل ہونے سے پیشتر اپنے پرانے پارچات بدل لینے چاہئیں اور اپنے ہاتھوں کو گرم پانی اور صابن کیلئے کامل طور پر صاف کر لینا چاہئے اگرچہ ظاہر نظر نہیں کپڑوں کا بدلنا اور ہاتھوں کا دھونا معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں مگر انکے فائدے بہت بڑے ہیں۔ پارچات دیواروں چار پائون صدقہ و تون اور ہر ایک چیز پر صاف کئے قسم کے باریک کپڑے موجود ہوں۔ ہمیں جو بلا خورد وین کے نظر نہیں آسکتے ان میں سے بعض قسم کے کپڑے بہت مشرق اور خطرناک ہوتے ہیں اگر زخم یا دہم یا کچلی ہوئی جگہ پر لگجا دیں تو اس جگہ اپنا اثر کر کے زہریلہ دم اور بخار پیدا کر دیتے ہیں جھقند دنیا میں چیزیں مٹتی ہیں یا غیر پیدا ہوتے ہیں وہ ان ہی باریک کپڑوں کی وجہ سے ہوتے ہیں مثلاً اگر دودھ یا گلیاں یا لکڑی یا گلوخت یا انکا وغیرہ پڑا رہے تو ضرور مٹ جائے اور زہرناک بن جائے لیکن اگر ان چیزوں کو ایسی ترکیب سے رکھا جائے کہ باریک کپڑے اثر نہ کریں تو کبھی نہیں مٹتا جیسے شراب میں مردہ جانور رکھے جاتے اور یز سون انہیں مٹتے ہیں اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ شراب تمام باریک کپڑوں کو جو مٹ نہیں پید کر سکتے والے ہیں ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس لئے مٹ نہیں پیدا نہیں ہوتی شراب کی طرح اور ہی ہزار ہا چیزیں ایسی ہیں جو ان باریک کپڑوں کو ہلاک کر دیتی ہیں اور جس چیز میں ملاوی جاوین او سکونٹہ نہیں دیتی مثلاً رسکپور۔ دار چکنا۔ پینکری۔ کا فور۔ کا بوباک ایسڈ۔ تمام خوش بھلاہ چیزیں مثل لوگ۔ اجاویں۔ سویلا۔ بان۔ زہرہ۔ پودینہ۔ الائچی۔ پینسرت۔ سنوٹھ۔ حنہ۔ ترشک۔ منتھال۔ اور ان چیزوں کے لطیف روغن۔ تارپین وغیرہ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام میں اسی سیکشن کی ہدایت تیز گری اور آگ پر پکھانے سے ہی یہ کپڑے ہلاک ہو جاتے ہیں یعنی اور بند ہوا کی جگہ میں بکثرت پیدا ہوتے ہیں کہلی ہوا روشنی اور صاف خشک جگہ میں کم ہونے ہیں پیدا ہونے کی وجہ سے انعام نہائی اور حرام ایسے دم خوردہ اور نازک ہوتے ہیں کہ اگر سیلے کچلے کپڑوں اور ان دھتے ہاتھوں کے ساتھ دایہ کام کرے

تواندیش ہو کر کسی قسم کے ذہنی کپڑے اوکے بدن میں سرایت کر کے ذہریلے درم اور بخار پیدا کر دین۔ زہریلے بخار اور درم کو روکنے کے واسطے یہ نہایت ضروری ہے کہ دایہ کو تمام کپڑے صاف دھو کر پہنا کر گرم دانی اور صابون کیساتھ ہاتھ صاف کرادے بجادین۔ ناخون بھی کتر دویسنے چاہئیں تاکہ اندر ہاتھ ڈالنے میں کوئی زخم وغیرہ نہ ہو سکے اور نہ بچے کی جھلی قبل از وقت پھٹے بڑھتے ہوئے ناخون سے اندر زخم ہو چکا اندر جھلی کے قبل از وقت پھٹ جائیگا اندیشہ ہوتا ہو ہمارے ملک کی یہ نہایت خوفناک جہالت ہے کہ ان باتوں کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا بلکہ اکثر دایہ نہایت ہی غلیظ ہوتی ہیں اور بعض شہر وں میں تو چوڑی چھاری یا دھنکے دایہ کا کام لیا جاتا ہے حقدردانہ کی غلطی سے خطرات ہیں اور کھایان اس رسالہ میں نہیں سما سکتا بان اس قدر ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ جس قدر ملک اور متعدی امراض ہیں مثلاً بچہ کا بخار سرخ باد۔ رحم کی درم۔ رحم کا پوٹیل پید کی درم۔ پیڈ و کا پوٹیل اندام نہانی کا درم اور پوٹیل ماسٹر۔ بچہ کا چھک تپ بخور۔ انہما کر اور تشنج وغیرہ یہ تمام باریک کیرٹون کی افزائش سے پیدا ہوتے ہیں اور جب جسم کمزور ہو یا کسی حصہ جسم میں زخم یا درم یا کپل ہوتی جگہ موجود ہو تو یہ کیرٹے قابو پا کر اڑ کر جاسکتے ہیں اور طرح طرح کے احراض پیدا کر دیتے ہیں۔ درجہ کی نازک حالت ان کیرٹوں کے واسطے نہایت ہی عمدہ موقع ہوتا ہے پس اگر پوری پوری حفاظت نہ کی جاوے تو زچہ اور بچہ کو ہر قسم کے مہلک مرض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھنا سوائے دایہ کے بدن اور کپڑوں کا صاف ہونا اور زچہ کے کپڑے بستر اور مکان کی کامل طور پر صاف اور خشک رکھنا آفات ناگہانی سے بچنے کے واسطے ضروری ہے۔ تمام اہل وسعت افغان کو چاہیے کہ دایہ کی واسطے ایک الگ جوڑہ کپڑوں کا بنوا کر رکھ چوڑا کرین اور زچہ کے قریب آنے سے پیشتر اسکو گرم پانی اور صابون کے ساتھ نہلا کر پہنا دیا کرین اس میں صدمہ امراض سے حفاظت ہو جب دایہ نہلا دیکھو کہ اور صاف کپڑے پہنکر طیار ہو جاوے اور سوختہ درجہ کے قریب جا کر معلوم کرے کہ کچھ کس صورت سے پیدا ہو رہا ہے عموماً اپنی پچا لاسے فیصدی تو بچہ سر کے بل پیدا ہوتے ہیں جبکہ بیان باب پنجم میں کیا جائیگا اور پانچ فیصدی غیر معمولی طریق سے پیدا ہوتے ہیں کوئی ٹانگوں کے بل کوئی آٹا۔ کسی میں چہرہ پہلے آتا ہے کسی میں نال پہلے آتا ہے۔ ان تمام غیر معمولی صورتوں کا ذکر اس کتاب میں

باب میں کیا جائیگا انشا اللہ تعالیٰ ادا ہے کہ چار بجے کہ زچہ خانہ میں پہنچتے ہی یہ چیزیں فوراً اپنے قریب رکھالے۔ تیز قہنجی۔ ایک گرو فلادین بچہ کو پیٹنے کے واسطے تین چار بالشت کا ایک فیتہ بچہ کی نال باندھنے کے واسطے تیز قہنجی نال کاٹنے کے واسطے ایک ٹکڑا گرم پانی کا اور ایک ٹھنڈے پانی کا بچہ کو نہلانے دہلانے اور دیگر ضروریات کے واسطے۔ دو چوٹے مشعلے یا کوئلے صحت نایل کا تیل دلو تو جس میں ایک ماشہ کار باک ایسڈ یا کافور ملا لیا گیا ہو ہاتھ اور اوتھلیوں کی پشت پر لگانے کیواسطے تاکہ اندر کسی قسم کی رگڑ نہ پہنچے اور کافور یا کار باک ایسڈ کی وجہ سے ہارک کیڑے جو ہاتھ پر دھوئے کے بعد بھی لگے رہ گئے ہوں ہلاک ہو جائیں۔ اب زچہ خانہ کا حال سنو۔ خود کشی اور بچہ کشی کے بہت سے خطرناک سامان میں سے زچہ خانوں کی حالت ہو جو عمدہ اچارے ملک میں پیدا کی جاتی ہیں۔ زچہ کا بستر ادا کپڑے غلیظ اور نمناک رہتے ہیں ہر چار طرف سے روشنی اور ہوا کے راستہ بند کر دے جاتے ہیں۔ کہہ کی زمین پانی پیناب اور خلافت سے سلا بھی ہوئی رہتی ہے یہ ایسے سامان ہیں جو ایک تندرست قوی آدمی کو بھی چند روز میں بیمار کر سکتے ہیں چہ جائے کہ بچہ یا زچہ اور اس کا بیول سا بچہ طرفیہ ہو کہ مہلک بھی زچہ خانے کی بند ہوا یا بدبو یا سلاجر سے بچہ کا گلا بیٹھ جائے یا کہانی ہو جائے یا بیٹ میں درد و فزع ہو جائے یا آنکھیں سرخ ہو جائیں یا منہ و دم کراے سبکی وجہ سے بچہ کیواسطے دودھ چوگنا و غوار جو جائے تو آدھ کر آسب خیال کر کے سیال کو جہاں پہونک کے واسطے بلائے اور باقاعدہ علاج نہیں کراتے ہیں۔ بیوقوف سیال نے ایسی تدبیر تھاتے ہیں جس سے در زمین مرتا ہوا بچہ اوسیر و زمر جائے مثلاً کہتے ہیں کہ مکان کی زمین کو لپ دوسات ہتی پانی میں جوش دیکر اسی کمرہ کے اندریان کو نہلاؤ جس سے کمرہ کے اندر پانی بکھر کر اوس سیلاب زدہ ہو جاتی ہو۔ اسی سبب سے بچہ زمین پر ہوتا ہاں اور اس سبب کی ترقی ہو کر بچہ دو چند تیار ہو جاتا ہو۔ ایک موبی ٹی بوت ہو اور ہر ایک کی سمجھ میں نہ سانی آسکتی ہو اور ہر ایک کا تجربہ نہ ہو نہ ہی دیر میں ہر ایک شخص کو سمجھا سکتا ہو کہ جس مکان میں بنی ہو۔ ہوا بند رہے تازی ہوا اور روشنی کا گذر نہ ہو اوس میں پہلے پہلے آدھی کو بھی نزلہ زکام۔ درد سر۔ درد شکم بے چینی۔ گھٹائی۔ اسہال اور بخار وغیرہ امراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ناذک بچہ اور مصیبت

زود ملن ایسی جگہ میں تبدیل رہ سکتی ہیں مگر انوس کہ اس معاملہ میں زور بہر عقل سے کام لیں
 کیا جاتا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ہزار مایچے، ہزار ہوتے اور منالچہ دوتے دیکھتے جاتے ہیں مگر کبھی
 حالت اور وجوہات پر غور نہیں کیا جاتا اور ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ سیا توکل جڑ پونک کے نیچے آیا
 وہ ملک الموت کا شکار ہوا مگر ہر بھی دانستہ بچہ حکومت کا ہی لقمہ بناتے رہتے ہیں۔

عدہ ہوا۔ کافی روشنی، صاف مکان، خشک اور تہرے کپڑے گرمی اور سردی سے حفاظت
 عام حالت میں حفظ صحت کے واسطے نہایت ضروری امور ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کی بھی کمی جو
 ضرورت کوئی نہ کوئی بیماری یا امثالہ ہو جاتی تو نازک بچہ اور چہرے کے واسطے تو ادھکا اعلیٰ درجہ پر انتظام رہنا
 نہایت ہی ضروری ہے کہ نہ دھوپ اور بچہ کا جسم ایسا نازک ہوتا ہے کہ تھوڑی سی غرابی کی بھی برداشت
 نہیں ہو سکتی بلکہ نور کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے چلے پھر تے تندرست آدمی کو چند روز کو واسطے ایک
 بندھن دار اور متعفن مکان میں بند کر کے دیکھو تو سہی کہ کتنے بھوت اور جڑیل اسکو چلتے ہیں تو پھر
 بیماری مان اور بچہ کا کیا تصور ہو کہ ان کو زہریلے مکان میں حبس بچا کی طور پر رکھا جاتا ہے پس جو مکان
 زچہ خانہ کے واسطے تجویز کیا جائے اس میں مفصلہ ذیل امور کا عملی ناطہ نہایت ضروری ہو۔

(۱) مکان کافی طور پر ذراچ ہو یعنی کم از کم پانچ چھ گز لمبا اور تین گز چوڑا ہو۔

(۲) ہوا اور روشنی کا اوس میں کافی طور پر گردش ہو تاکہ ہوا ہر وقت بدلتی رہے تاکہ در بدو وار زہریلے مادہ اور
 مٹی جوا میں جمع ہونے سے پاوے۔

(۳) دوسرے مکانات اور صحن کی نسبت اسکی کرسی اونچی ہو تاکہ خوب خشک اور صاف رہ سکے۔

(۴) حتی الوسع کمرہ کو کامل طور پر خشک اور صاف رکھنا چاہیے۔

(۵) زچہ کے پاس ایک کمرہ میں زیادہ ہجوم اور غور و غل ہونا سخت مضر ہے۔

(۶) اگر سردی کی وجہ سے کمرہ میں آگ کی ضرورت ہو تو کوئلہ سلکا کرگ رکھنی چاہیے اگر چینی موجود ہو تو

اوس میں لگ سلکا سکتی ہیں۔ کمرہ میں دھواں ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ دیوئیں سے بچہ کی آنکھیں

بہت دیکھنے آجاتی ہیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔

(۷) کہہ کے دروازے ایسے ممتون میں ہوں کہ گرمی موسمی اور بارش کی بوجہ اس سے کافی حفاظت رہ سکے۔

(۸) زچہ کا بستر اور کپڑے کامل طور پر صاف اور خشک رکھنے چاہئیں۔

(۹) بچہ کو روزانہ گرم پانی اور صابون کے ساتھ نہلا کر اور سکادہ صاف کپڑے کے ساتھ خشک کرتے رہیں۔

(۱۰) کسی قسم کی نمی زچہ کے کمرہ میں نہ رہنی چاہیئے۔

(۱۱) بچے کے کپڑے اور بستر خوب صاف اور خشک رکھنے چاہئیں۔ مگر افسوس کہ خود غامی اور غلط

کیا واسطے تو بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے۔ لیکن معصوم بچہ کی واسطے صاف اور خشک کپڑا مہیا کرنے ہو تو دل

دکھتا اور ہمیشہ اس معاملہ میں لاپرواہی کی جاتی ہے۔ اگر اسکے والدین کو سمجھا یا بھی جاوے تو عموماً یہی

جواب ملتا ہے کہ بچہ کے کپڑے کیسے خشک اور صاف رہ سکیں اور اسکے پاخانہ اور پیشاب کا تو ہر وقت

تفتیر رہتا ہے جو حقیقت یہ ہے کہ اپنی بیوقوفی کو وہ سمجھتے نہیں اور طبیب کی راہی کو سرسری خیال کر کے

فاہیات جواب سے ٹال دیتے ہیں اگر ان کو یہ سمجھ جائے کہ تمام بچے اور نہیں کی بیوقوفی سے ہلاک

ہوئے ہیں اور تمام بہت چڑیل اور نہیں کے ہاتھوں کی کمائی ہیں تو وہ اپنی بچہ کش اور چہ کش حرکات سے

باز آجھا دیں جب زچہ خانہ اور بچہ اور مان کے کپڑوں کو پورے طور پر صاف اور خشک نہیں رکھا جاتا تو کتنا

کی ہوا آنتا کہ اور متعفن ہو کر بچہ میں مصلہ ذیل امراض پیدا کر دیتی ہے۔ ماضیہ کی خرابی۔ دودھ ڈالنا۔ پیٹ

کا درد۔ دست۔ کھانسی۔ گھٹا کا بیٹھ جائے۔ بند کی ورم۔ اثر لایعین بچوں کا تشجہ پھوڑے پہنسی۔ آنکھوں

کے ورم۔ سفادخون۔ لاغر ہونا۔ وغیرہ۔ ہمیشہ ماضیہ خراب رہنے کی وجہ سے بچہ سوکنا چلا جاتا ہے یہاں

تک کہ اوس کا تمام گوشت زایل ہو کر ہڈیاں الگ الگ نظر آنے لگتا ہیں اور جلد میں بوڑھوں کی طرح جھڑ

پڑ جاتی ہیں کوئی دوا اور کوئی غذا اوس کو فائدہ نہیں کر پاتی۔ اور آخر کار ہلاک ہو جاتا ہے۔

جب بچہ کو کھانسی ہو یا کھلا پیٹھ جائے یا منہ کے اندر ورم یا آبلہ ہوں یا تشجہ کا مرض ہو تو اوسکے

واسطے دودھ چھوٹنا محال ہوتا ہے۔ سمالت کا نام آسیب رکھ کر علاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں یہ نہایت ہی خوفناک

حالت ہے۔ اگر تشجہ کا مرض پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر پیدا ہو تو بچہ کچھ محال ہوتا ہے لیکن اگر

سات روز کے بعد یہ تو تشجہ ذرا دیر بھی جاتا ہے بشرطیکہ باقاعدہ علاج کر لیا جاوے

باب پنجم پیدائش کے تین درجے اور اونکا خاص خاص انتظام
 درجہ اول میں رحم کا منہ کشادہ ہوتا ہے رحم بار بار زور کے ساتھ سکڑ کر بانی کی بہری ہوتی پہلی کو منہ کے اندر سے باہر کو دیکھتا ہے۔ جس سے فائدہ کے طور پر زور پڑ کر منہ کھلتا چلا جاتا ہے عموماً اس درجہ کی میعاد (۲ گھنٹہ) سے ۱۸ گھنٹہ تک ہو اس عرصہ میں رحم کا منہ کشادہ ہو کر اس کا چکر قریب پندرہ انچ تک ہو جاتا ہے جس کے اندر سے بچہ کا منہ باسانی نکل سکتا ہے۔

درجہ دوم میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسکی میعاد ایک گھنٹہ سے ۲ گھنٹہ تک ہے۔
 درجہ سیم میں آنول باہر آجاتی ہے۔ ان درجن کو خوب یاد رکھنا چاہیے کیونکہ آئندہ بار بار ان کا حوالہ دیا جائیگا۔ رحم کا منہ کشادہ کر کے اور بچہ اور آنول باہر نکالنے میں دو قسم کی طاقتیں سہرت ہوتی ہیں اول تو خود رحم کا زور کے ساتھ سکڑنا دوم پیٹ کے پتھوں کا سکڑنا۔ پیدائش کے وقت جب رحم سکڑتا ہے تو ہر دفعہ سکڑنے کے ساتھ درد اڑھتا ہے اس لئے رحم کا سکڑنا اور درد اڑھنا ایک ہی معنی میں مستقل ہوتے ہیں درد وقفہ سے اور بار بار اڑھتا ہے ایک درد قریباً ایک منٹ رہتا ہے۔ ہر درد میں رحم اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف کو سکڑتا ہوا چلا آتا ہے اور قوتِ اندک کی جہلی سے چکر باہر نکلتی ہے اور ہر فرم رحم کے ریشہ کے پیچھے میں اس طرح سے ہر درد کے ساتھ منہ کھلتا چلا جاتا ہے وقفہ وقفہ سے درد اڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں آنول بچہ کی جان بچ رہتی ہے اگر درد برابر رہے تو تھوڑی دیر میں ہی مان کو تھکا کر حال سے بچال کر دے اور درد ہر آنول کا خون بند کر کے بچہ کو ہلاک کر ڈالے۔ بعض صورتوں میں تو درد بہت ضعیف ہوتا ہے اور بعض میں بہت شدید پیدائش کا درد پہلے تو کم سے اونٹھکر پیٹ کی طرف کو آتا ہے اور وہ مبدم تیز اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے پہلے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اندر سے کھینچا یا پیتا ہے۔ بعد میں جب سر پیچڑ و مین اور تر آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اندر سے دھکیل کر نیچے کو اوتار رہا ہے۔ ساتھ ہی رگوں پر دباؤ پڑ کر ناگین بھی سن اور درد نکالنے کی چلی جاتی ہیں۔ بار بار کے درد سے مان کی نہیں قدرت سے تیز جاتی ہے اور ضعیف بن جاتی ہو جاتا ہے۔ ایک درد کا وہ ہوتا ہے جسکو دایان یے وقوفی سے اصل درد سمجھا جاتا ہے کی فکر میں لگتی ہیں اور طرہ طرہ علی دست اندازی سے خرابیاں کر بیٹھتی ہیں اس کی پہچان یہ ہے

کہ دردمگر سے شروع ہو کر بیٹ کی طرف نہیں آتا بلکہ سامنے کی طرف ہوتا ہو اور صلی مرد کی طرح سے
 بڑھتا نہیں جاتا ہوتا تو قاعدہ کے وقفہ سے اڑتا ہے اور نہ اس سے رحم کا منہ ہی کھلتا ہو یہ عموماً قبض
 کی وجہ سے ہو جایا کرتا ہو اور حقنہ کر دینے یا خفیت مسہل دیدینے سے رفع ہو جاتا ہو۔ پس جب
 اس قسم کا درد دیکھو تو فوراً ایک سیڑی گرم پانی میں ۱۵ یا ۲۰ منی صابون کھول کر حقنہ کر دیا ہم ڈرام کیشنگ
 پلاو۔ اس سے تمام درد رفع ہو جائیگا پیدائش سے ایک ہفتہ پیشتر رحم کی قدر پڑو میں اتر جاتا ہے
 جس سے بیٹ قدرے ہلکا ہو کر اس آسان ہو جاتا ہو لیکن اودھر مشانہ مقد اور پیڈو کی رگوں پر دبا
 پڑ کر طرح کی تکلیفیں ہو جاتی ہیں مثلاً پیشاب بار بار آتا کر گھاتا ہے یا خانہ بند ہو جاتا یا بار بار حاجت
 ہوتی ہو تاگوں میں درد اور دم ہو کر چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہو۔ اگر پیشاب نہ کجائے تو بڑی نلکی داخل
 کر کے نکال دیا جائیے اگر قبض ہو تو دم گرم کر دیا جائے پلا کر صحت کر دینا چاہیے اگر تاگوں میں درد یا دم
 رہے تو تاریل کا تیل گرم کر کے مالش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات اس ہفتہ میں قدرے خون لعاب
 کے ساتھ ملا ہوا بھی نکل آتا ہو اور رحم کا منہ نرم ہو جاتا ہو۔ پس یہ تینوں ابتدائی علامات ہیں جس سے
 پیدائش کا قریب ہونا سمجھا جاسکتا ہو۔

اب ہر ایک درد کی علیحدہ علیحدہ کیفیت سنو۔

پیدائش کا پہلا درد۔ اس میں رحم کا منہ اندر کی طرف سے کشادہ ہونا شروع ہو کر آہستہ آہستہ پتلا اور کشادہ
 ہوتا چلا جاتا ہے اسکے اندر سے پانی کی تہلی نکلتی معلوم ہوتی ہو درد کے ساتھ دم بھی تنہا آتا ہو اور
 پانی کی تہلی بھی جب جہم کا منہ خوب کشادہ ہو کر ادر کا چکر پندرہ انگشت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو جہلیان
 قدرت الہی سے خود بخود پھٹ کر کچھ حصہ پانی کا خارج ہو جاتا ہو اور باقی بند ہو جاتا ہو کیونکہ بچہ کا سر فرم رحم
 میں اوڑھ کر اسکو بند کر دیتا ہو۔ بعض اوقات جہلیان سخت اور مضبوط ہوتی ہیں اور خود بخود ہندین پھٹتیں
 پس جب ایسا ہو کہ فرم کافی طور پر کشادہ ہو جائے لیکن جہلیان نہ پھٹیں تو کسی تدبیر سے پہاڑ دینا چاہیے
 مثلاً نمک کی ڈلی یا ناخن سے کہی ایسا ہی ہوتا ہو کہ بچہ جہلیان سمیت باہر آ جاتا ہے جبکہ بعض دانیان
 اپنی بے وقوفی سے ہر ایک خلات فطرت شے سمجھ کر گراویں میں حالانکہ ان کے اندر زندہ بچہ ہوتا ہے

پس جب ایسا ہو تو جہلی کو فوراً پہاڑ کچھ نچال لینا چاہیے ورنہ بچہ دم گھٹ کر مر جاوے گا۔ جب فم رحم خوب کھل کر تنجا تا ہے تو بعض اوقات زچہ کو تے شروع ہو جاتی ہو اس درجہ میں زچہ کو آہستہ آہستہ کمرہ میں چلانا پھرانا چاہیے جہی کہ جہلیان پہنکر پانی جاری ہو جائے۔ جب پانی جاری ہو گیا تو سجدہ کو کباب دوسرا درجہ شروع ہو گیا ہر تب فوراً زچہ کو بائیں کروٹ پر لٹا کر ایک تکیہ اوکے سر کے نیچے رکھ دین اور دونوں ٹانگیں پیٹ کی طرف سکیڑ کر ایک تکیہ گھٹنوں کے درمیان رکھ دین اگر پہلے درجہ میں مر بیٹھ کر پیاس لگے تو گرم گرم دودھ پلا دین اس سے تقویت بھی ہوگی اور فم رحم جلدی کشا دہ بھی ہو جائے گا۔ اگر فم رحم کے کھلنے میں معمول سے زیادہ دیر ہو جائے تو مریضہ کے منہ میں اوکے بال دیکر لکیان کرانی چاہئیں اس سے فم رحم کی کشادگی کو بہت مدد ملتی ہے مریضہ کو آہستہ آہستہ کمرہ میں چلانے پھرانے سے کئی فائدہ ہیں ایک تو اس طرح کرنے سے سر نیچے رہتا ہو اور بلوٹن یا ماتہ کہ نیچے آتا ہے دوسرے رحم کی کشادگی میں بھی مدد ملتی ہے خواہ مریضہ کو چلنے پھرنے میں تھوڑی سی تکلیف ہی ہو تو اس کو تاکید سے پھرانا چاہیے۔

۲۔ ہماری دایہوں کی سخت غلطی ہے کہ زچہ کو درد کے اوٹھتے ہی کہہ دیتی ہیں کہ بیٹھ جا اور زور کر اس درجہ میں بیٹھنا اور زور کرنا غیر مفید ہی نہیں بلکہ مضر بھی ہو کیونکہ ایک تو اس درجہ میں خوزد کر کے کچھ فائدہ نہیں دوسرے زور کرنے سے مریضہ تک کر دوسرے درجہ میں زور لگانے کے قابل نہیں رہتی۔ ستھم اپنا زور لگانے سے اندیشہ ہے کہ جہلیان قبل از وقت پہنکر پانی خارج ہو جائے یعنی ابھی رحم کافی طور پر کشادہ نہ ہو اور جہلیان پھٹ کر پانی نکل جائے پھر فم رحم کے کشادہ ہونے اور پیدائش میں سخت دقت واقع ہو جاتی ہو۔ ایک اور خطرناک بیوقوفی ہے جو اکثر دایان کر بیٹھتی ہیں وہ یہ کہ مریضہ کو غذا نہیں دیتی خواہ دو دروز گذر جائیں بھاری زچہ تخلیق اور فاقہ کی مصیبتوں سے جان بلب ہو جاتی ہو اس درجہ میں مزد گرم دودھ پلانا چاہیے لیکن دوسرے اور تیسرے درجہ میں ٹھنڈا دودھ اور ٹھنڈا پانی پلانا چاہیے کیونکہ ان درجہ میں گرم دودھ سے خون کے جاری ہونیکا اندیشہ ہے اور ٹھنڈا دودھ وہ پانی پلانے سے رحم خوب سکڑا کر خون کو بند کر لیا ہو۔ بعض دایان جو دودھ وغیرہ

درجی ہی ہیں تو وہ ٹیون درجن کو یکساں شمار کر کے سخت غلطی کر رہتے ہیں کہ ٹیون درجن میں گرم
دودھ پلائی رہتی ہیں یہ سخت غلطی ہو اس سے خبردار رہنا چاہیے پیدائش کے وقت دودھ کے علاوہ
ساگوانہ اراوٹ وغیرہ بھی حسب ضرورت دے سکتے ہیں مگر یہ خوب یاد رہے کہ ہر شے پہلے درجہ میں گرم
دینی چاہیے اور دوسرے اور تیسرے درجہ میں ٹھنڈی۔

پیدائش کا دوسرا درجہ۔ اس درجہ میں بچہ باہر آتا ہے پہلے اس کا سر رحم سے نکل کر پیڑ میں اوتار
ہے درجہ جلدی جلدی اور بڑے زور کے ساتھ اٹھتا اور ان بھی دم بند کر کے پیڑ کے عیضات سے خوب
دبا لی ہوئی ہوتی ہیں ہاتھوں سے چار پائی پکڑ کر اور پاؤں کو دیوار پر پیڑ میں قائم کر کے زور لگاتی ہے اس لئے
بہتر ہے کہ چار پائی کے سر پہلے کی طرف ایک تولیہ باندھ رکھیں تاکہ ہاتھوں سے اس کو پکڑ کر زور لگانے کے بجائے
سر پیڑ کی رگوں کو دبا کر ٹانگوں میں زور دے سننا ہٹ پیدا کر دیتا ہو اگر ایسا ہو تو نایل کا تیل گرم کر کے
ٹانگوں پر مالش کریں۔ اگر مفقہ کے اندر باخانہ جمع ہو تو سر کے داؤ سے خود بخود نکل پڑتا ہے جو جب سر
باہر نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو زچہ اکثر بڑبڑانے لگتی ہے سر کے نچلے سے پہلے سیون میں سر کا اوجھار
معلوم ہوتا ہے اس وقت دایہ کی مدد کا رکھنا چاہیے کہ زچہ کے پیچھے پیچھے کر سیون پر ایسے طریق سے دباؤ دینا تاکہ
رنگے کہ اندام نہانی کے ایک طرف الگوٹھا اور دوسرے طرف بائیں اڈنگلیاں رہیں اور مہینگی سیون پر رکھ
اس سے یہ فائدہ ہو کہ اگر سر پہلے نکلے تو داؤ سے باہر نکلنے کے پہلے جالے کا اندیشہ ہوتا ہے
ہاتھ کا سہارا رہنے سے یہ اندیشہ کم ہو جاتا ہے مگر ہاتھ کا زیادہ دباؤ مہین ڈالنا چاہیے صرف اتنا دباؤ سہارا
رکھنا چاہیے جو درد کے ساتھ سر باہر کو نکلتا ہو اور وقفہ کے ساتھ پھر اندر چلا جاتا ہو اسی طرح چند بار
حرکت ہو کر باہر نکل آتا ہے جو جب سر باہر نکل آیا تو فوراً گردن پر ہاتھ پیر کر دیکھیں کہ نال تو لپٹی ہوئی نہیں
اگر نال لپٹی ہوئی ہو تو آہستگی اور نرمی کے ساتھ اس کے بل کھو کر نال دے چاہئیں ایسا نہ ہو کہ کہلو تو
ہوئے نال ٹوٹ کر ایک نمی آفت پیدا ہو جائے اگر بائیں چہرے بل ہوں جبکہ کھولنے میں زیادہ دقت محسوس
ہو تو ایسا کریں کہ ایک بند بچہ کی ناف کی طرف اور دوسرا زچہ کی طرف لگا کر پیچھون کو پیچھی کے ساتھ کاٹ
ڈالیں۔ جب نادان دایوں کے ہاتھ میں لیے اتفاقات ہوتے ہیں تو ادنیٰ ہو جاتی ہے۔

ہلاک ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ تو او کو بل کھولنے کی احتیاط معلوم ہوتے ہیں اور نہ کاٹنے کا ہی طریق
 جانتی ہیں سر نکلنے کے بعد تھوڑے وقفہ سے درد اٹھ کر پہلے ایک کندہ باہر آ جاتا ہے پھر دوسرا
 باہر آ کر سچ کا سینہ شکم وغیرہ جلدی سے نکل آتے ہیں لیکن اگر سر نکلنے کے بعد کچھ دیر تک درد نہ آئے
 تو ہاتھ سے پیٹ کو نیچے کی طرف دبانا اور مسلنا چاہئے اس سے درد شروع ہو کر کندہ باہر آ جاویں گے
 اگر اس طرح سے بھی کندہ باہر آنے نہ شروع نہ ہوں تو دایہ کو چاہیے کہ ایک ہاتھ سے گردن کو سہا کر
 دوسری ہاتھ کی دواؤں انگلیاں بچہ کی بغل میں لپکا کر باہر کو کھینچ کر سے یا دو ٹون ٹون میں دو ٹون
 ہاتھوں کی دو دو انگلیاں لپکا کر کھینچ کرے۔ اس طرح سے کچھ باسانی باہر آ جائیگا یہ یاد رکھنا چاہئے کہ
 سر کا پیر کھینچنا سخت ہلکا سے اس سے گردن کی ہڈی اوکھڑ کر دیا کو دبا لیتی ہے اور فوراً بچہ مر جاتا ہے
 چنانچہ نادان دایین کے ہاتھ میں اکثر ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سو بھی یاد رکھنا چاہئے کہ
 اگر کچھ کھینچ کر نکالا گیا ہے تو پیٹ پر ہاتھ سے باہر دبا کر دباؤ رکھنا چاہئے ورنہ خون جاری ہو کر دم
 ہلاک ہو جاویں گے۔ جب تک آواز باہر نہ نکلے پٹکا وغیرہ پیٹ پر نہ باندھ دیا جائے اس وقت تک
 پیٹ پر برابر دباؤ رکھنا چاہئے۔

جب بچہ باہر نکل آئے تو فوراً اس کو زچہ لے آئے سے ایک طرف کر لیں ایسا نہ ہو کہ بچہ کا خون جلد
 سے نکال کر بچہ کو لپٹ کر دس غنیمت فوراً بچہ کو ایک طرف کر کے اس کے منہ میں انٹلی ڈال کر تمام ششوں
 جو پیدائش کے وقت نکل گیا ہوا صاف کر دیں نہ مان ہوئے کے بعد بچہ فوراً دتا ہو جو اس بات کی
 دلیل ہو کہ اس کو سانس آنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اگر بچہ نہ روئے تو فوراً اس کو مصنوعی طور پر سانس
 دینے کی تدابیر کریں اول تو فوراً اس کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیں اس سے سبکیاں لیکر روئے
 لگے گا۔ اگر اس سے بھی سانس نہ آوے تو فوراً ٹھنڈے پانی میں بٹھا کر دٹھالیں اس سے سبکی اگر روئے
 لگیگا اگر اب بھی روئے نہ لگے تو ایسا کریں کہ ایک دفعہ گرم پانی میں بٹھا کر پھر ٹھنڈے پانی میں بٹھا دیں
 پھر دوبارہ گرم پانی میں بٹھا کر ٹھنڈے پانی میں بٹھا دیں اسی طرح جا رہا بچہ دفعہ کریں۔ اگر اب بھی سبکی
 نہ آوے اور رونا شروع نہ کرے تو بچہ کو گو دھن بٹھا کر حسب ذیل سانس دیں۔ دو ٹون بانو پکڑ کر سر کی طرف

کھینچیں اور اس کے منہ کے اندر پونک ماریں پھر دو وزن بازوؤں کو سینہ پر لجا کر بادیں اس سے سینہ کے اندر کی ہوا دب کر باہر جا دیگی۔ پھر بازوؤں کو سر کی طرف کھینچ کر منہ کے اندر پونک ماریں اس طرح سے ہوا اس کے اندر چلی جا دیگی۔ الغرض اسی طرح سے ہوا اندر پہنچتی ہے اور باہر نکالتے رہیں چکر پانچ منٹ تک ایسا عمل کریں۔ اگر اس عمل سے بھی سانس آنا شروع نہ ہو تو سمجھ لو کہ اب کچھ چکا اور کوئی علاج باقی نہیں رہا۔

یہ تمام تدابیر عیشہ یاد رکھنی چاہئیں انکی لاعلمی سے اکثر بچے جیتے جاگتے نادان دایئوں کے ہاتھ میں تلف ہو جاتے ہیں۔ دایئوں کی موتی سے سر پر ہٹا پانی ڈال دیتی ہیں جس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔ بعض دایئیں سیاہ چرچ اپنے منہ میں چبا کر بچہ کی ناک اور منہ میں پھونکتی ہیں اس سے اگرچہ سانس آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن بچہ کو دمہ ہو نیکا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب بچہ باہر نکل کر رونے لگے تو فوراً اس کے نال ناف سے تین انگشت کے فاصلہ پر فیدہ کے ساتھ باندھیں اور اسی طرح دوسرا بندھیں اس سے ایک انگشت کے فاصلہ پر باندھ کر تیز کھینچی کے ساتھ درمیان سے کاٹ دیں۔ مگر دیسی دایئیں ان پینچی کے بجائے پھسکا کے ساتھ رگڑ رگڑ کر کاٹتی ہیں اس سے بچہ کو سخت دکھ ہوتا ہے اور بلبلا تا ہے۔ مرض اٹھ رہا بھی اس تکلیف سے بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ یہ سخت بے رحمی ہے کہ بچہ کو ناحق تکلیف دی جائے۔ دای کو اس بات سے متنبہ کرنا چاہیے دوسری غلطی نال کے بارے میں یہ کرتی ہیں کہ نال کو محض بچہ کی طرف سے باندھ کر کاٹ دیا کرتی ہیں دوسری طرف کا سر اکھلا کر بکریاں کا بہت سا خون نکھلتا ہے اور نال بھی دیر سے خشک ہو کر گر جاتی ہے اگر دوسرا سر باندھ دیا گیا ہے تو نال پر رہنے کی وجہ سے جلدی پہول جا نیگی اور اس کے اندر کا خون بھی جھڑک نال جلدی خشک ہونی شروع ہو کر جلدی گر جا نیگی۔ یہ دونوں غلطیاں دایئوں کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہئیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر پیدا ہو کر بچہ نہ رووے اور اس کا چہرہ اور آنکھیں نیلگوں ہوں تو ایسی صورت میں نال کا بڑا کڑا دیکھو بھر بچہ کی طرف سے کاخون نکالیں بعد ازاں بندھن لگا دیں۔ اگر اس طرح کرنے سے بچہ نہ رووے تو چونکہ اوپر بیان کیا چکی ہیں ترتیب دار کرنی چاہئیں نال کو تات کدہ نہ باندھنا چاہیے کہونکہ تات سخت اور تیز ہوتا ہے اس سے نال کا کڑا گون کا منہ کھلے گا اندیشہ ہوتا ہے جس سے بچہ ہلاک ہو سکتا ہے نال کے منہ کو آگ یا گرم لوہے کے ساتھ نیچا نہیں مٹھنا ہے اس سے بچہ کو قہقہہ ہو نیکا اندیشہ ہوتا ہے۔ دیسی

باہر مین پکڑ کر دوڑاؤ ٹھننے کے ساتھ زور سے پھوڑیں آنول نکلنے کے بعد بھی اس طرح پندرہ بیس منٹ تک دباتے اور پھوڑتے رہیں تاکہ خون کے چھید چھڑے بھی رحم کے اندر سے صاف ہو جاویں اگر اس عمل سے آنول باہر نہ آوے تب آرگٹ کھلانی چاہیے کیونکہ یہ نہایت ہی قوی الاثر دوا ہے اسکے کھلانے سے رحم فوراً بڑے زور سے ساتھ سکر کر رہے گا گولاس بنجاتا ہے اور اندیشہ ہو کہ آنول کو توڑ کر نکال دے اور کوئی ٹکڑا اس کے اندر رہ جائے۔ جب آنول نکل چکے اور وقت اس کا دینا خون کو فوراً بند کر دیتا ہو۔ اگر آنول کے ساتھ بچہ کی جھلی باہر نہ نکلی ہو تو اس کو رسی کی طرح بل دیکر اور کھینچ کر باہر نکال لینا چاہیے۔ آنول کے نکلنے اور خون کے چھید چھڑے صاف ہونے کے بعد پیٹ پر رحم کے مقابل غلاہین کی گدی رکھ کر بچکا بندھ دیں اس سے خون بن بند رہیگا رحم جلدی سکرے گا بگکا اور زچہ کا پیٹ بھی نہ ٹٹکریگا بعد از ان زچہ کے قریب ہر قسم کا شور وغل بند کر دیں تاکہ زچہ کو نیند آجائے اس سے بڑا آرام ملتا ہو۔ جھنے کے بعد ایک دن زچہ کو ہرگز بستر سے نہ اٹھنے دیں اور دس روز تک آرام سے لٹائے رکھیں یہ ایک مہنگ رواج ہو کہ جھنے کے بعد انیان زچہ کو بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے واسطے کہدتی ہیں اور مسئلہ یہ بنا رکھا ہو کہ بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے خون جھڑکتا ہو اس میں خون خارج ہونے اور شیشی ہو کر زچہ کے درمیان آتا دیشہ ہو۔ چار روز بعد تک زچہ کو محض دو دھسا گودانہ یا اراروٹ کی غذا دیتے ہیں۔ نفیل غذا سے یہ نقصان ہو کہ تیسرے روز پستان مین دودھ اوترنے کی وجہ سے جو بخار ہوتا ہو دن زیادہ ہو جاوے اور مرہضہ کو دیر تک خراب کرے شکم اور اندام ہناتی پر فلاہین کی گدی گرم کر کے سینک دینا ورم کو روکتا اور نیز مرہضہ کو تسکین دہ معلوم ہوتا ہو۔ پہلے دس روز مین مرہضہ کے بدن کو گرم بلانی مین تولیہ بھگو کر اور پھر کر اس صاف کرتے رہیں بعد از ان بیس یوم تک گرم بلانی سے نہلا کر مناسب ہو سر دپانی سے نہلانا زچہ کے لئے سخت مضر ہو اس سے تشنج۔ کھانسی گھٹتی ہے۔ اسمان پیشل و درہر قسم کے امراض کا اندیشہ ہی جھنے کے بعد ایک دن زلات قبض کا رہنا اچھا ہو اس کے بعد اگر خود بخود دست آجائے تو بہتر ورنہ ایک دن کسٹریٹل پلا دینا چاہیے۔

باب ششم زچہ کی حالت اور اس کی حفاظت

پیدائش کے بعد عموماً غفیف لرزہ معلوم ہوتا ہو جو جلدی سے جاتا رہتا ہے۔ رحم کے سکر نکالنے اور پستان

مین دودھ اوترنے کی وجہ سے ایک دودھ کا بخار بھی ہو جاتا ہے دو تین روز مین جب دودھ اچھی طرح سے اوتر آیا تو یہ بخار خود بخود جاتا رہتا ہے۔ لیکن اگر بخار سودھ سے اوپر مسلسل رہے تو بچہ چاہیے کہ قبض یا سبے چینی یا گرم یا کوئی اور سبب ہو اس کا علاج کرنا چاہیے ہم گھٹنے کے بکائیئرنگ ایک اونس پلاکریٹ کو صاف کر دینا مناسب ہے۔ بعض اوقات مثانہ کی کمزوری یا گرم سے پیشاب بھی رگ جاتا ہے سینک کرنے سے اسکو آرام ملتا ہے دودھ عموماً پیدائش سے ۸ مہینہ بعد اوترنا شروع ہو کر پستان متورم ہو جاتی ہیں جبکی وجہ سے بعض تیز اور ضعیف حرارت ہو جاتی ہے دو تین روز مین یہ تکلیف نفع ہو جاتی ہیں۔ رحم کے لحمی ریشے چربی مین بدلتے تحلیل ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ دو ہفتہ مین رحم کا حجم اور وزن نصف کے قریب ہو جاتا ہے دوسرے مہینے کے اعتقاد تک اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے۔ اگر زچہ پورا احتیاط نہ رکھے اور غنے سے چار یا پانچ روز بعد ہی اچھلنا پھرنا اور کام کرنا شروع کر دے تو رحم اصلی حالت پر نہیں آتا بلکہ ہمیشہ کے واسطے بڑا ہوا رہتا ہے چند روز تک اندام نہانی پر دھم رہتا ہے جسکے واسطے سینک دینا مفید اور خوشگوار ہوتا ہے چار۔ پانچ روز بعد تک دھم مین در داؤٹھتا رہتا ہے اسکی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رحم کی کمزوری یا نادان دانیوں کے بجا دست اینٹیج کی وجہ سے آؤل کے ٹکڑے یا خون کے چھید پڑے رحم کے اندر بند رہیالے تین اسوجہ سے رحم سکولر اور زور کر کے اوکو خارج کرنا چاہتا ہے۔ ایک مہینہ تک رطوبت رحم سے خارج ہوتی رہتی ہے جسکو ٹھنڈا کھتے ہیں چار روز تک یہ رطوبت خون سے ملی ہوئی شرح رنگت کی ہوتی ہے اور اکثر خون کے چھید پڑے بھی اسکے ساتھ نکلے ہیں۔ پانچویں دن سے نوین دن تک اس کی رنگت سبز رہتی ہے پھر روز کے بعد لعاب آمیز پیر کی کیفیت ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ صدامی لعاب دار رطوبت بجاتی ہے اگر رحم مین زخم ہو جائے یا کسی وجہ سے اس کا مہر چٹ جائے تو نفاثات مدت تک شرح رنگت کے رہتے ہیں اور خون کے چھید پڑے بکثرت نکلے ہیں۔ جبکہ مہر نے سے تعفن بھی ہو جاتا ہے اور زہر بلہ بخار کا اندیشہ ہوتا ہے ایسی حالت مین اندام نہانی کو دواؤں کے پانی سے روزانہ دھو کر صاف رکھنا ضروری ہے۔ دھو کے پانچاٹ اور مکان کو کھال طور پر صاف اور خشک رکھنا چاہیے سردی کے موسم مین چینی مین

اگ سنگا کر کہ کو قدرے گرم رکھنا مناسب ہے، بدن پر سرد پانی یا جو اکا جو کا گنے یا گینے کی پڑے رہنے سے تیغ - کزان - درمعدہ - درد رحم اور پیش ہو جائیگا اندیشہ ہی مکان اور کپڑوں کے میلا کھیلارہنے سے ایک قسم کا زہر یا بخار ہو جاتا ہے جسکو زچہ کا بخار کہتے ہیں اس بخار میں رحم کے اندر متعدی درم ہو جاتے ہیں جب یہ بخار ہو جائے تو کوئی مریض نہ بچتی ہو - اکثر ہلاک ہو جاتی ہیں - یہ بخار سخت متعدی ہوتا ہے جب ایک زچہ کو ہو جائے تو اس کا دن یا ستر میں اگر پورا پورا انتظام نہ کیا جائے تو وبا کے طور پر تمام زچہ جو قوت کو ہو جاتا ہے پیدیا ہونے کے بعد دس یوم تک زچہ کے واسطے کھڑ ہونا اور بیٹھنا سخت مضر ہے پیشا پڑے پڑے کرنا چاہیے ایک مہینہ تک بدن کے کسی حصہ میں ٹھنڈا پانی لگانا - ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دونا یا نہلانا - تیغ - گرازا اور درد پیدا کر دیتا ہو اس لئے منہ ہاتھ دھو لے اور نہالے میں گرم پانی استعمال کرنا چاہیے - پیدایش کے بعد اگر درد شدید رہے تو ایک رتی انیون کھلا کر اوسکو کم کر سکتے ہیں لیکن اوس کا دقتاً بند کرنا مناسب نہیں کیونکہ یہ درد اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ رحم کے اندر خون کے چھید پڑے یا آنول کے ٹکڑے باقی رہ گئے ہیں جسکے نکلنے کے واسطے درد اوٹھتا ہے زچہ کو کم اکرم تین ہفتہ تک اپنا کوئی معمولی کام کاج نہ کرنا چاہیے ورنہ خطر حکے امراض پیدا ہو جائیگے جن سے تمام عمر خلاصی ہوئی دشوار ہے اور درم کی وجہ سے پیشاب بند ہو جائے تو بڑی تلکی داخل کر کے نکال سکتی ہیں اکثر سینک دینے سے بھی پیشاب خود بخود آ جاتا ہو -

باب ہفتم - پیدایش کی غیر معمولی صورتیں اور اونکا انتظام یعنی دایہ اور ڈاکٹر کا کام
سوچن میں سے بچاؤ تو عموماً اسی طریق پر پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ پانچویں باب میں مفصل ذکر کیا جا چکا ہے وہ فیصدی بچے اور اور مختلف صورتوں میں پیدا ہوتے ہیں -

کل پیدایش کی صورتیں حسب ذیل ہیں -

اول - سر کے بل پیدا ہونا - اس صورت میں یا تو ورٹیکس یعنی پیچھے نکلتا ہے یا پیشانی یا چہرہ -

مشافہہ پیشانی کے مقابل چہرہ کا اوپر ہوا حصہ ہے اوسکو کسی پٹ کہتے ہیں اور سر کا وہ حصہ جو پیشانی اور کسی پٹ کے درمیان ہو ورٹیکس کہلاتا ہے یہ دونوں نام یعنی ورٹیکس ادا کسی پٹ یا رکھتے چاہئیں کیونکہ آئینہ اور سنگا نام بار بار لکھنا -

دو تہم۔ پیدہ کے بل پیدا ہونا اس صورت میں یا تو کو لے پہلے نکلے ہیں یا گھٹنے یا پاؤں۔

تو تہم۔ آڑا پیدا ہونا۔ اس صورت میں یا تو موٹے پہلے نکلے ہیں یا ہاتھ۔

چہارم۔ جسم کے ایک سے زیادہ حصوں کا ایک دفعہ خارج ہونا مثلاً سر کے ساتھ ایک ہاتھ یا پاؤں نکلتا یا ہاتھ و پاؤں اکٹھے پیدا ہونا۔ چہرہ۔ نال کا پہلے نکلنا۔

ان تمام صورتوں میں سر کے طرت کی پیدائش سب سے آسان اور بے خطرہ ہو خداوند کریم کے انتظام سے عموماً اسی طریق پر پیدائش ہوتی ہے اس پیدائش میں بچہ خود بخود باہر آ جاتا ہے اور دایہ و ذاکتر کی کچھ بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام زچہ اور بچہ نادان دائیوں کے ہاتھوں میں ہلاک ہی ہو کر تے اور پیدائش ایک نہایت ہی خطرناک ماجرا ہو جاتا اب اگر پیدائش کی تمام صورتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے تو مفصلہ ذیل اقسام ہوتی ہیں۔

۱) سر کے بل پیدا ہونا جس میں دیکھیں یعنی قلا پہلے برآمد ہو۔ (۲) چہرہ کے بل پیدا ہونا۔

(۳) پیشانی کے بل پیدا ہونا۔ (۴) کو لے یا گھٹنے یا سر پہلے برآمد ہونا۔

(۵) آڑا پیدا ہونا۔ (۶) سر کے ساتھ ایک ہاتھ یا پاؤں کا برآمد ہونا۔

(۷) ایک ہاتھ اور پاؤں کا اکٹھا نکلتا۔ (۸) نال کا پہلے نکلنا۔

اب ہم ذیل میں ان اقسام پیدائش کا بیان علیحدہ علیحدہ درج کرتے ہیں

اول سر کے بل پیدا ہونا جس میں قلا پہلے خارج ہو۔ عموماً اسی طریق سے پیدائش ہوتی ہے اور یہی طریق سب سے آسان ہے۔ اس لئے دائیوں کو کچھ وقت ادھائی بنیں پڑتی اور ذاکتر کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی اس کا مفصل بیان باب پنجم میں کیا جا چکا ہے۔

اس صورت میں جب بچہ کی پیشانی مان کے پیچھے کی طرف اور کسی پٹ سے سائے کی طرف ہوتا ہے اور اگر کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا اور عموماً پیدائش اسی طور پر ہوتی ہے لیکن بعض اوقات بچہ کی پیشانی سائے کی طرف اور کسی پٹ سے پیچھے کی طرف ہو جاتے ہیں اکثر تو اس صورت میں بھی بچہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے لیکن گہبی کبھی دایہ اور ذاکتر کے امداد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دایہ کو چاہئے کہ اگر پیشانی سائے کی طرف

پہر گئی ہو تو دو اونٹلیوں کے ساتھ پیشانی کو اوپر کی طرف اٹھامے اس طرح کرنے سے بچہ کی گردن ہلنا
کی طرف خم کھا جائیگی اور سر پھر کر پیشانی پہلی طرف خود بخود چلی جاوے گی۔ اگر اس طرح پیشانی پر کر پھلی طرف
نہ جاوے تو انڈر ہاتھ ڈاکر اور سر کو ہل کر پھر دینا چاہیئے۔ اگر اس طریق سے بھی سر نہ پھرے اور بچہ پیدا
ہو تو معلوم نہ ہو اور وقت زیادہ گزرنا جاوے تو قفلٹ یا دیکلٹس بچہ کے کسی پتہ میں پسار کی طرح
کھینچنا چاہیئے اس سے بھی اگر پیشانی پر پھر سامنے کی طرف نہ آوے تو فارسیس کا استعمال ضروری ہو جاتا
ہے مگر چونکہ اوزاریون کا استعمال ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں اس لئے انہی کی تفصیل اس رسالہ میں کرنا غیر معقول
ہے تفصیل کیلئے دیکھو مفید عام بین فارسیس کا بیان۔

دوسرے چہرہ کے بل پیدا ہونا۔ اس صورت میں بچہ تھوڑی سی سانس کی طرف ہونو کچھ وقت نہیں ہوتی اور
عموماً ہونا ہی ایسا ہی جو لیکن اگر تھوڑی سی پہلی طرف پھر جائے تو اس میں ادا کی ضرورت پڑتی ہے۔
پس دایہ کو چاہیئے کہ جب اس کو معالیم ہونے لگے کہ تھوڑی سی پہلی طرف پھر گئی ہے تو روکے کے ساتھ پیشانی پر
اوپر اور پیچھے کی طرف اونٹلیوں کے ساتھ دباؤ ڈالے اس سے تھوڑی خود بخود پھر کر سامنے کی طرف
آجائے گی۔ اور بچہ خود بخود پیدا ہو جائیگا اگر اس طرح سے تھوڑی سی پھرے تو بچہ کو پٹانے کی کوشش کریں۔ یا
اکسی پٹ کو قفلٹ کے ساتھ نیچے کی طرف کھینچیں جب ان تمام طریقوں میں ناکامی رہے تو فارسیس لگانا
یا بچہ کا سر توڑ کر نکالنا ضروری ہو جاتا ہے ورنہ بچہ اور ماں دونوں کی ہلاکت کا اندیشہ ہو مگر فارسیس لگانا
یا سر توڑ کر نکالنا خاص ڈاکٹر کا کام ہے اس میں دایہ کچھ نہیں کر سکتی اسلئے فوراً ڈاکٹر کو بلوانا چاہیئے زیادہ
تفصیل کیلئے دیکھو مفید عام بین ویشن اور کرینیا ٹومی کا بیان۔

سٹوم۔ پٹناتی کے بل پیدا ہونا۔ اسکی شناخت یہ ہے کہ دو اونٹلیاں ڈالنے سے پیشانی ہلدرخانہ چشم کے
کیناڑے اور سامنے کی پہلی معلوم ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ سر جہاں کی طرف جھنگ رہی ہو
ہو جاتی ہے جو سر کے بل پیدا ہونے کی ہو یا پیشانی اوپر کو اٹھ کر چہرہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو پس پیشانی
کے بجائے قدامت یا چہرہ برآمد ہو کر پیشانی ہوتی ہے اس صورت میں دایہ کا یہ کام ہے کہ پیشانی کو ہلکے سے
کیا تھوڑا دباؤ دینے کے وقت اوپر کی طرف دھکیلے تاکہ پیشانی کے بجائے قدامت پیدا ہو سکے یا برعکس اس کے

کسی ہٹ کو اذگیوں کے ساتھ اوپر کی طرف دیکھنے تاکہ چہرہ نیچے آجائے اگر اس عمل میں ناکامی رہے تو
 فارسیس لگانے چاہئیں اگر فارسیس سے بھی چو پید نہ ہو تو سر توڑ کر کھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلئے
 جب ہایڈوگلیوں کے ساتھ پیشانی کو پھر کر اس کی جگہ ٹھکانا چہرہ نیچے نہ لاسکے تو فوراً ڈاکٹر کو بلانا چاہیے
 ورنہ بچہ اور ان دونوں ہلاک ہو جائیگی زیادہ تفصیل کیلئے دیکھو بیان فارسیس اور کرینیا ٹومی کا مفید نام
 چہارم۔ کسے یا گھٹنے یا پاؤں پہلے ٹھکانا پسینا لیس پیدا ہونے میں ایک مچ پیڈ وکی طرف سے پیدا ہوتا ہے
 اسکے وجوہات حسب ذیل ہوتے ہیں (۱) پیڈ وکی کا تنگ ہونا (۲) جلی وچ سے سر پیڈ وکی کے اندر آسانی نہیں آتی
 (۳) بچہ کی تھیلی کے اندر پانی معمول سے زیادہ ہونا جسکی وجہ سے بچہ معمول سے زیادہ پھرتا رہتا ہے (۴) گرم
 کی دیوار کا ڈھیلہ ہونا (۵) پانی کا دفعتاً خارج ہو جانا جسکی وجہ سے پاؤں پہل کر نیچے اترتا ہے (۶) بچہ کا
 زیادہ حرکتیں کرنا۔ جب بچہ پیڈ وکی سے بل پیدا ہوتا ہے تو اس میں بچہ کے واسطے یہ خطرہ ہو کہ نال دیکر بچہ کا
 خون بند ہو جائے اس صورت میں گیارہ بچوں میں سے ایک مر جاتا ہے مگر ان کے واسطے اس میں کچھ خطرہ نہیں
 اسلئے ہایڈو اکثر کاسپ سے مقدم یہ فرض ہوتا ہے کہ جب بچہ کو پیڈ وکی طرف سے پیدا ہوتا ہے کہیں تو نال کا براہ
 خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ اوپر دباؤ پڑ کر خون بند ہو جاوے اور بچہ مر جاوے نال کے بجائے کی یہ ترکیب
 ہے کہ نال کو درمیان خط سے ہٹا کر بچہ کی ایک طرف کر دیا وے۔ دایہ جب زچہ کے قریب جاوے تو سچے
 مقدم اس کا یہ فرض ہو کہ بیرونی اور اندر والی استخوان سے پیدائش کی صورت معلوم کرے یعنی یہ دیکھے
 کہ بچہ سر کے بل پیدا ہو رہا ہو یا پیڈ وکی سے بل یا آڈا اور پھر یہ معلوم کرے کہ ان تینوں صورتوں میں سے
 کونسی قسم ہے چنانچہ پیدائش کی قسمیں پچھاننے کی ترکیب اور اسکی علامات ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔
 اگر بچہ سر کے بل پیدا ہو تو اسکی پچھان حسب ذیل ہے (۱) میٹ پیدائش پھر لے اور ٹٹولنے سے معلوم ہو سکتا
 ہے کہ سر اوپر کی طرف نہیں۔ اندام منہ کی مین ہاتھ ڈالنے سے معلوم ہو جائیگا کہ جسم کا منہ بند ہے کھل
 رہا ہو اور چلیان گوکہ کی شکل میں آہستہ آہستہ باہر نکل رہی ہیں۔ پانی توڑا سا خارج ہو کر بند ہو جاتا ہے کہ بچہ
 بچہ کا سر دم کے منہ میں اوڑھ کر اسکو بند کر دیتا ہے پانی نکلنے کے بعد سر کی گولائی اور اسکی چلیان صاف طور پر
 معلوم ہو جائیگی۔ اگر بچہ چہرہ کے بل پیدا ہو تو اس کے منہ کا سولہ جیر ٹونکے کنا سے ناک خانہ چترم کے

کنارے اور ٹھوڑی انگلی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر پیشانی کی لمبیدار ہو تو خانہ چشم کے کنارے اور
پیشانی معلوم کر کے تشخیص کر سکتے ہیں۔ اگر کوئے پہلے ٹھلین تو انگلی کے ساتھ باخانہ کا سورج معلوم کر کے
اوس سے اگے پیچھے کی طرف انگلی پہرین اس سے خاص اعضاء محسوس ہو کر زیادہ کی پہچان بھی ساتھ ہی
ہو جاوے گی۔ اگر پاؤں پہلے نکلے تو اوسکی یہ پہچان ہو کہ پاؤں کی انگلیاں انگوٹھے کی طرف سے برابر چوٹی
جلا آئی ہیں اور دوسری انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ مقابل نہیں ہو سکتیں۔ نیز پیر کا ایک کنارہ دوسرے
کی نسبت موٹا ہو اور ایسی کا ادبھار بھی معلوم ہو سکتا ہے اگر ہاتھ پہلے نکلے تو اوسکی کیفیت پاؤں کے
خلاف ہو کیونکہ ہاتھ کا انگوٹھا دوسری انگلیوں سے دور ہوتا ہے اور اوسکی طرف سے باقی انگلیاں برابر
نہیں ہوتی جاتی تمام انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ مقابل ہو سکتی ہیں اور ہاتھ کے دونوں کنارے برابر
ہوتے ہوتے ہیں اور ایسی کی طرح کوئی ادبھار بھی نہیں ہوتا اگر گھٹنے پہلے نکلے تو اوسکو کہنی سے اس طرح
پہچان سکتی ہیں کہ گھٹنے کی چپنی کو ادبھار دیر ملا سکتی ہیں لیکن کہنی پر جو ہڈی کا ادبھار ہے وہ ہلایا نہیں
جا سکتا جب بچہ کا پاؤں یا گھٹنے یا ہاتھ یا کہنی پہلے نکلے ہیں تو بچہ کی جھلی کا پانی تمام ایک ہی دفعہ خارج
ہو جاتا ہے۔ کولے اور موٹے کی صورت میں پانی سر کی نسبت زیادہ خارج ہوتا ہے یہ تمام تشخیص علامات
دایہ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہئیں۔ درجہ پیدائش کی صورت کو صحیح صحیح طور پر نہیں پہچان سکیگی اور جب صورت
پیدائش ہی اوسکو معلوم نہ ہو تو اوس کا حاصل انتظام کس طرح کر سکتی ہو معمولی حالتوں میں تو بچہ خود ہی
پیدا ہو جاتا ہے اور دایہ کی امداد کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی۔ اوس کا کام تو غیری معمولی اوقات میں بچہ کو اپنی
دائیں سے منہوانا ہے۔ جب دائیں کو اتنی عقل نہ ہو وہ دائیں کے نام کے لائین نہیں ایسی نام کی دایہ کو کہنی
زچہ کے قریب نہیں لیجانا چاہئے۔

جب یہ تشخیص ہو جائے کہ بچہ پیدو کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے تو دائیں کو حسب ذیل تدابیر کرنی چاہئیں
اول بچہ کی جھلی کو جلد ہی نہ پھٹنے دے۔ اگر رحم کا منہ پورے طور پر کھلنے سے پیشتر جھلی پھٹ جائے
تو تمام پانی یک دفعہ خارج ہو کہ بچہ کی پیدائش محال ہو جاوے گی ساتھ ہی بچہ کے مرنے اور رحم کے پھٹ جانے
اور دوسرے اعضاء کو گرہ اور باؤ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا جس سے بچہ اور زچہ دونوں ہلاک

ہو سکتے ہیں۔ اسلئے ساسبات کی بڑی احتیاط چاہیئے کہ جہل قبل از وقت نہ پھٹے دوسرے ہالون اور
 کوئلے ٹھلنے کے بعد جب تک بچے کے ہاتھ باہر نہ نکلیں بچہ کو کھینچنا نہ چاہیئے اگر بچہ کھینچنا چاہیگا تو اس کے
 ہاتھ سر کے اوپر چلے جائیں گے اور سر کے ٹھلنے میں باج ہو گئے۔ جب بچہ پیڈر کے بل پیدا ہوتا ہے
 تو رحم کا منہ اس قدر نہیں کھلتا کہ سر آسانی سے محل سے پھر جب ہاتھ بھی سر کی طرف چلے جائیں تو سر اور
 ہاتھوں کا اگنے ٹھلنا محال ہو جاتا ہے۔ اسلئے یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ گھسیطہ بچے کے ہاتھ سر کے
 اوپر بنائے پادین اس کی تذبذب بھی سرے کہ بچہ کو بالکل پکڑ کر نہ کھینچیں کھینچنا ٹھکانے میں یہ بھی دقت ہے
 کہ رحم کا منہ سر کے اخراج کے واسطے کافی طور پر نہیں کھلتا اور جب سر کے ٹھلنے میں دیر ہو تو اس سے
 نیم لے خالی تھن میں خون بہکے بچہ کو ہلاک کر سکتا ہے۔

توسیم الزکوئلے ٹھلنے کے بعد پیدا این میں زیادہ دقت گذر جائے تو منہ باندیروں کے ساتھ ہونا
 کی کوشش کرنی چاہیئے یا پچھلے یا یکوہین کہ بچے کے ہاتھ جسم کے ساتھ ٹھلنے میں یا نہیں اگر بچے کے
 ہاتھ جسم کے ساتھ نہ ٹھلے ہوں بلکہ سر کے اوپر چلے گئے ہوں تو دواؤں نکلیاں بچے کے نیم کے ساتھ لیک باڈ
 کی پچھلی طرف لیجا دیں اور پھر بازو میں پیسا کر اسکو سر اور چہرہ کی طرف دیکھتے ہوئے چھاتی اور پیٹ کی
 طرف لے آویں اگر سیدہ یا بچے کو زور کیا جائیگا تو اس سے بازو ٹوٹ جائیگا۔ اسلئے اس کا بڑا خیال
 رکھنا چاہیئے ایک بازو کو نیچے لانے کے بعد اسطرح دوسرے بازو کو پیٹ کی طرف اتار لیں جب دونوں
 ہاتھ جسم کے ساتھ ابھرا جائیں اور سو وقت کھینچ کر سکتے ہیں لیکن جب رحم میں درد اٹھے اس کے درد کے ساتھ
 کھینچ کرنی چاہیئے۔

چھاتم جب کوئلے باہر آجادیں تو فوراً نال کو وسطی خط سے جتا کر بچے کے ایک پہلو کی طرف کریں تاکہ اوپر
 دیاؤ پکڑ کر خون بند نہ ہو جائے بعد میں توڑے توڑے دفعہ نال کی ہفتوں کا معلوم کر لے تب میں اگر نصفین
 جاری ہوں تو سمجھنا چاہیئے کہ بچہ کا خون بہی جاری ہوا اور اگر بند ہوں تو سمجھنا چاہیئے کہ بچہ کا خون بند ہو گیا
 ہے اور غریب ہر دم گھٹ کر مر جائے جب ایسی صورت پیدا ہو تو فوراً مصنوعی طور پر جیسا کہ اوپر بیان کیا
 گیا اس کے ٹھکانے کی کوشش کریں جب بچہ کا پیچہ بازو نیچے لانا ہو تو اسے جسم کو سامنے کی طرف دبانے چاہیئے

اور جب سامنے کا بازو اوتا ہوا ہو تو پیچھے کی طرف دبانا چاہیے ہاتھ نکالنے کے بعد اگر پیدائش میں دیر ہوئی حال
کی خضین بند ہو جائیں جن سے بچہ کو کھینچ کر نکالنا ضروری ہو جاوے تو جس طرف بچہ کی پیٹھ ہو اسی سمت
میں بچہ کا بدن پکڑ کر کھینچنا چاہیے ساتھ ہی ان کے پیٹ کو دبا کر یا اس کی مقعد میں انگلی داخل کر کے
اور سر کو دبا کر کھینچ کے امداد کر سکتے ہیں۔

پنجم۔ پیڈ کی صورت میں جب بچہ کی پیٹھ سامنے کی طرف ہوتی ہو تو پیدائش میں کچھ وقت نہیں ہوتی
لیکن جب اس کی پیٹھ پھیلی طرف چلی جاتی ہو تو بعض اوقات بڑی دقت ہو جاتی ہے اسلئے ولیم کا یہ فرض
ہے کہ اس امر کی احتیاط رکھے کہ بچہ کی پیٹھ مان کی پیٹھ کی طرف نہ جاتی پادے اور اگر ایسا ہو جاوے تو اس کو
پہر کر سامنے کی طرف لائیکل کوشش کرے لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے اور پیدائش میں زیادہ دیر واقع ہوتی جائے
تو بچہ کے بدن کو پکڑ کر پہلے کی پیٹھ کی طرف کو اہستگی اور نرمی کے ساتھ کھینچے اگر اس طرح سے سر باہر نہ نکلے تو
پھر اس کے بدن کو پکڑ کر ان کے پیٹ کی طرف کھینچے اس طریق سے سر باہر آ جائیگا اگر اس طریق سے بھی سر
باہر نہ آوے تو سر میں سوراخ کر کے ماس کو توڑ کر نکالنا ضروری ہو جاتا ہو مگر یہ کام ڈاکٹر کا ہو۔ زیادہ تفصیل
کے لئے دیکھو مفید عام میں پر فوریشن اور کرینیا ٹومی کا بیان۔

ششم۔ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہو کہ رحم کے صنف یا پیڈ کی تنگی کی وجہ سے بچہ کے چوتھے نیچے
نہیں اترتے بلکہ اوپر ہی اوپر اٹکے رہتے ہیں ایسی صورت میں ولیم کو چاہیے کہ بچہ کا ایک پاؤں پکڑ کر
ماہر کھینچ لی اگر بچہ کے چوتھے رحم سے نکل کر پیڈ میں اتر آئیں لیکن پیڈ سے باہر نہ نکلیں یا وقت زیادہ گزرتا
جائے تو ایک انگلی گچ مان میں پینا کر سامنے کی مان پہلے باہر کھینچ لیں بعد ازاں دوسری طرف کی ران
خود بخود باہر آ جائیگی اور بچہ پیدا ہو جائیگا۔ اگر دوسری طرف کا چوتھا خود بخود باہر نہ آوے تو اس کو بھی
اسی طرح انگلی داخل کر کے کھینچ لینا چاہیے اگر پیڈ بہت ہی تنگ ہو کہ چوتھا کی طرف سے باہر نہ آسکیں
تو ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ وہ بچہ کو کاٹ کر باہر نکال دیکھا تفصیل کیلئے دیکھو مفید عام میں بیان یا ممبر یا ٹومی کا
پنجم بچہ کا آٹا ہو کر پیدا ہونا اس صورت میں بچہ کا صبر مان کے رحم میں دائیں اور بائیں جانب ہوتا ہو اور
پیٹھ سامنے یا پیچھے کی طرف اور بچہ کا ایک مونڈ یا ہاتھ یا کہ پیٹ باہر نکلتا ہو جب یہ صورت ہو جائے تو

تو ثابت زندہ بچہ خود بخود کی طرح پیدا نہیں ہو سکتا اس صورت میں نصف کے قریب بچے ہلاک ہو جاتے ہیں اور زمین سے ایک ماں مر جاتی ہے جو جب یہ معلوم ہو جائے کہ بچہ اڑا پڑا ہی تو فوراً اس کو پلٹ کر سر یا پاؤں نیچے لائے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ بچہ پلٹانے کے مقصد فیل طریق ہیں۔

پہلا طریق خارجی ہے۔ جب تک بچہ کی جہلی سالم ہے اور پانی خارج نہیں ہوا اور وقت تک بچہ کو جیٹن جانین بآسانی پھیر سکتی ہیں پہلے ہاتھوں سے شکم کو ٹپٹل کر یہ معلوم کریں کہ بچہ کا سر کس طرف ہے اور پیڈ کس طرف ہے جب یہ معلوم ہو جائے تو ایک ہتھیلی سر کے مقابل شکم مادر پر رکھ کر سر کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف دبا دیں ساتھ ہی دوسری طرف ہتھیلی اس کے پیڈ کے نیچے شکم پر رکھ کر اوٹھاتے جانین اس طرح پھیلائی اور دانی کے ساتھ عمل کرنے سے سر نیچے کی طرف اور پیڈ اوپر کی طرف آتا جائیگا۔ جب سر نیچے کی طرف آ جائے تو شکم کو ہاتھ سے دبا کر رکھیں تاکہ سر نیچے کی طرف قائم رہے ایسا نہ ہو کہ پھر سر پھر سکر رحم کی ایک جانب چلا جاوے۔

دوسرا طریق خارجی اور اندرونی ہے۔ یہ عمل بھی اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ جلیان سالم ہو اور پانی خارج نہ ہوا ہو اسکی ترکیب یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی دو انگلیاں رحم کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور دوسرا ہاتھ شکم مادر پر رکھتے ہیں۔ پھر بیرونی ہاتھ سے سر کو نیچے کی طرف دباتے چلتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ بچے کے منہ سے کو سر کا تے ہیں یہاں تک کہ بچہ کا سر نیچے آجائے جب بچہ کا سر نیچے آ جاوے تو فوراً دو انگلیاں رحم کے اندر سے نکال کر ان کے سپیٹ کو دبا کر رکھیں تاکہ بچہ پھر نہ پلٹ جاوے برعکس اسکے اگر بچہ کا پیڈ نیچے آوے تو اندر نظر ہو تو اس کے خلاف عمل کرتے ہیں یعنی بیرونی ہاتھ کے ساتھ سر کو اوپر کی طرف اوٹھاتے چلتے اور دو انگلیوں کے ساتھ اندرونی جانب سے اسی سمت میں بچہ کو دھکیلتے جاتے ہیں اور جب بچہ کا پاؤں باگھٹنہ اوٹھائیو کو معلوم ہو تو فوراً جہلی کو ہراؤ کر اس گھٹنہ یا پاؤں کو پکڑ کر باہر کھینچ لیتے ہیں تیسرا طریق محض داخلی ہے۔ اس طریق میں ایک ہاتھ رحم کے اندر داخل کر کے بچہ کی ٹانگ پکڑتے اور کھینچ لیتے ہیں۔ اگر جہلی سالم ہے اور پانی ابھی تک خارج نہیں ہوا ہے تو بائیں ہاتھ داخل کر کے پہلے بچہ کے شکم کو معلوم کریں پھر اسے شکم کے ساتھ ساتھ ہاتھ پھر کر اسکی ٹانگوں کو معلوم کریں جب اچھی طرح

سے گھٹن یا ٹانگ معلوم ہو جاوے تو چلی کو بہار کرادو کہ پکڑ لیں اور نیچے کی طرف کھینچیں دوسرے
 ٹانگ کو اندر ہی رہنے دین تاکہ پیڈ کے ساتھ خارج ہو کر فرم کو بخوبی کشادہ کر دے اور باقی جسم اور سر کے
 نکلنے میں کچھ دقت نہ ہو۔ لیکن اگر چلی بھٹ کر بچ کا ہاتھ باہر آ گیا ہو اور باقی ہی خارج ہو چکا ہے تو بچ
 کے ہاتھ کے ساتھ صاف کر کے دیکھیں کہ دائرے کے ساتھ ٹھیک متناسق یا بائین کے ساتھ
 پس اگر دائرے کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ ملے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ داہنا ہاتھ ہے اور اگر بائین کے ساتھ ٹھیک ملے
 تو سمجھنا چاہیے کہ بائیں ہاتھ ہے۔ جو جب یہ معلوم ہو جائے کہ داہنا یا بائیں ہاتھ ہو تو بچ کا نکلا ہوا دوسری
 جانب کا اپنا ہاتھ رحم کے اندر داخل کر کے بچہ کے شکم کو معلوم کریں اور دوسری جانب ٹانگ پکڑ کر نیچے
 کھینچیں اس طرح کرنے سے بچہ گھوم کر ہاتھ خود بخود اندر چلا جائیگا اور ٹانگ نیچے اور آگلی۔ یہ یاد رکھیں
 کہ بچہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے اندر کر نیکی ہرگز کوشش نہ کرنی چاہیے بلکہ اگر بائیں ہاتھ باہر آیا ہو تو اپنا
 بائیں ہاتھ رحم میں داخل کر کے داہنی ٹانگ پکڑ کر بچہ کو کھینچیں اور اگر داہنا ہاتھ باہر آیا ہے تو اپنا داہنا
 ہاتھ رحم میں داخل کر کے بائیں ٹانگ پکڑ کر بچہ کو کھینچیں اس طرح کرنے سے بچہ خود بخود گھوم جائیگا۔ اور تاکہ
 بھی خود بخود اندر چلا جاوے۔

اگر سر سرستد کر بالا طریقوں سے بچہ نہ پٹ سکے تو اس کے زندہ پیدا ہونے کی امید منقطع کر دینی چاہیے اور
 فوراً ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ وہ حسب طبع چاہیگا بچہ کو کاٹ کر نکالے گا۔ زیادہ تفصیل کیلئے دیکھو مفید علم میں
 بیان دیکھی شیشی اور لیمبر یا ڈومس کا۔

پچھلے سر کے ساتھ ایک ہاتھ یا پاؤں کا باندھنا اس صورت میں اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ سر پیڈو
 میں اور ڈاکٹر اور ہاتھ یا پاؤں خود بخود پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر پیڈ و فراخ ہو تو ہاتھ یا پاؤں کے ساتھ ہی
 سر کے نکلنے میں کچھ دقت نہیں ہوتی لیکن اگر پیڈ تنگ ہے تو سر پھنک رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا
 ہے کہ ہاتھ یا پاؤں پہلے اور سر کو ایک طرف کر دیتا ہے اور بچہ اڑا ہو جاتا ہے۔ اسلئے بہتر یہی ہے کہ جب سر کے
 ساتھ ایک ہاتھ یا پاؤں نکلنا معلوم ہو تو دایہ کو چاہیے کہ اپنی اونٹلیوں سے درو کے وقت ہاتھ یا پاؤں
 کو فرم رحم سے ایک طرف کرے تاکہ سر اور ڈاکٹر اور بعد میں ہان کے پیڈ کو دبائے رکھے تاکہ سر فرم رحم میں

تایم رکے۔ اگر ممکن ہو سکے تو ہاتھ با باؤن کو جو سر کے ساتھ اترتا معلوم ہوتا ہو راستہ سے پیچھے ہٹا دے۔

ہشتم۔ ہاتھ اور باؤن کا اکٹھا نکلنا۔ ہاتھ کو فوراً ہٹا کر باؤن یا ٹانگ کو پکڑ کر نیچے کھینچ لینا چاہیے ایسا ہنر کہتا ہے نیچے لوڑ آئے اور بچہ آؤ اور کو پیدائش میں وہی مشکلات واقع ہوں جو ادھر بیان کیا جا چکی ہیں۔

نہم۔ نال کا پہلے نکلنا۔ جب نال پہلے نکلے تو اس میں بچہ کے مہاے کا خطرہ ہو منفصل ذیل وجوہات

سے نال پہلے نکل آتی ہو۔ (۱) اگر نال معمول سے زیادہ لمبی ہو تو نیچے گر پڑتی اور خارج ہونے والے حصہ

سے پہلے باہر آجاتی ہو (۲) اگر بچہ کی جلی میں پانی معمول سے زیادہ ہو (۳) اگر جلی بھٹ کر پانی کی کثرت

خارج ہو تب بھی پانی کے راء کے ساتھ نال نکل آتی ہو (۴) جبکہ بچہ غیر معمولی طریقوں سے پیدا ہوا اور قرحم

کو جلدی سے اوتر کر بند نہ کرے اس وقت بھی نال نکل آتی ہو (۵) اگر پیڈ ٹنگ ہو اور بچہ کے اوترنے میں

دقت واقع ہو تب بھی نال پہلے اوتر آتی ہو۔ (۶) جبکہ آزل رحم کے نیچے کے حصہ میں منہ کے قریب

لگی ہوئی ہو تب بھی نال اوتر آتی ہو۔ نال ہاتھ لگائیے با سانی پہچانی جا سکتی ہو کہ چونکہ ہر دم رسی کے طور پر ہوتا ہے

جبکہ اوپر اور دہر با سانی ہلا سکتے اور خرم دیکھتے ہیں اور ڈاؤنگلیوں میں پکڑنے سے اسکی ہضنین جلتی معلوم ہوتی

ہیں درد کو وقت ہضنین بند ہو جاتی ہیں اور وقفہ میں پھر چلنے لگتی ہیں جب نال پہلے نکلے ہو تو نصف کے

قریب بچے نال کے دجا لے اور دم بند ہونے سے مر جاتے ہیں۔ مان کے واسطے اس میں کوئی ایسا

سہارا ہو لیکن بچہ کے واسطے یہ ضرورت بڑی خطرناک ہے۔ جبکہ معلوم ہو جاوے کہ نال نیچے اوتر ہی ہو

تو فوراً اوسکو واپس کر نیکی کو کشش کرنی چاہیئے۔ اس کے تین طریقہ ہیں اول تو یہ کہ نال کو معلوم کر کے وہ

اؤنگلیوں میں اوسکو پکڑیں اور جب درد بند ہو تو جو عضو خارج ہو رہا ہے اوسکے کنارہ سے رحم کے اندر

لیجاویں اور دوسرے ہاتھ سے پیٹ کو دباویں تاکہ سر یا کولے رحم کے منہ میں آ جاویں اور بعد میں دباؤ

تایم رکھیں تاکہ اوس جگہ تاہم رہ سکیں اور نال دوبارہ نیچے نہ اوتر سکے۔ دوسرا یہ طریق ہے کہ دھچکو

کھینچوں اور گھٹنوں پر کبیری کی طرح اوندھا کر کے سر میں اوسچہ کر دیتے ہیں تاکہ اپنے وزن سے نال باہر

پہنچے کو گڑنا چاہئے ساتھ ہی پہلے طریق پر دو اؤنگلیوں سے بھی نال کو پکڑ کر پیچھے ڈھکیلتے ہیں بعد ازاں

پیٹ کو دبا کر سر یا کولے کو نیچے اوتار دیتے ہیں تاکہ وہ حصہ رحم میں پہنچ کر اوسکو بند کر لیں اور پیٹ باکو

دباے رکھتے ہیں اور زچہ کو ایک پہلو پر لٹا کر اوکے پیڈ کے نیچے بکیہ رکھ دیتے ہیں تاکہ سرین اوٹھے رہیں اور نال بہر نیچے نگر کے تیسرے طریق پر ہے کہ کیتھ میٹر یا دیگر اوزاروں میں رسی کا حلقہ لگا کر نال کو اوس میں پکڑتے اور رحم کے اندر داخل کر دیتے ہیں اسکے بعد میں ہی وہی احتیاط ضروری ہیں جو طریق اول دوم میں بیان کئے گئے۔

اگر نال کی طرح سے پیچھے نہ ہٹ سکے یا بار بار آتی رہی تو بچہ کے جلدی جڑانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اصلی خط سے ایک طرف کر دیں تاکہ پیٹھ کی ہڈی کے اوپر نہ رہے اور پھر دیکھیں کہ سر پہلے اوترتے کو رہے یا کولے اگر سر پہلے اوترتے کو ہو تو فارسیس لگا کر سیدار لین اور اگر کولے اوترتے کو ہیں تو ایک ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیں۔

باب ہشتم زچہ کے امراض و روائع علاج

(۱) اتفاقی جریان خون۔ اگر رحم پر ضرب لگنے یا صدمہ پہونچنے یا پیدائش کے وقت آنول کے قبل از وقت ٹوٹ جانے سے خون جاری ہو تو اس کو اتفاقی جریان خون کہتے ہیں آنول کی میاریون آنکھ اور بخاروں سے بھی کہیں اتفاقی خون جاری ہو جاتا ہے۔ کہیں تو خون رحم کے اندر سے نکل باہر آجاتا ہے اور کہیں رحم کے اندر بند رہتا ہے جب رحم کے اندر جمع ہو جائے تو دفعتاً بلا کسی ظاہر سبب کے منت منت ہو جاتا ہے چہرہ کا لگ زرد ہو جاتا بغض نہایت پتلی اور سست پر جاتی ہے بدن ہٹتا ہوا کہ پسینے خود بخود آنے شروع ہو جاتے ہیں رحم کے مقام پر ایسا درد معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اندر سے کہنچتا یا ہٹاتا ہے اس پر پیٹ پر ہاتھ پھیرنے سے رحم یک سخت زیادہ بڑا ہوا اور کسی ایک حصہ میں ادبھا ہوا معلوم ہوتا ہے جب علامات سے ایسا تشخیص ہو جائے تو جلیون کو نالوں کے ساتھ پھاڑ کر دھل رتی ارگٹ کا سفوف پانی کے ساتھ کہلا دیں اور پیٹ پر مضبوط چمکا جائے اس سے درد اوتھکے چہرہ اچھا لگے گا اور خون بھی بند ہو جائیگا۔ اگر خون بند نہ ہو تو رحم کا منہ اور جلیون کے ساتھ کہو لکڑی کو فارسیس کے ساتھ یا پٹا کر نکال دینا چاہیے ورنہ زرد خون ٹھکڑا رہے گا ہلاک ہو جائیگی مگر یہ تمام کام ڈاکٹر کے کرنا ہوں اس لئے جب ایسا اتفاق ہو تو ہمیشہ ڈاکٹر سے رائے لیکر

کام کرنا چاہیئے۔

(۲) لازمی جریان خون۔ جب آئول کسی وجہ سے رحم کے منہ کے قریب لگا ہوا ہوتا ہو تو ایام حمل میں چپٹر مہینے کے بعد ہمیشہ کبھی کبھی خون جاری ہوتا رہتا ہو اور کتا وقتیکہ بچہ پیدا نہ ہو لے بلا استقاط نہ کرایا جاوے اوصوت تک یہ خون بند نہیں ہو سکتا اس لئے اس مرض کا نام لازمی جریان خون رکھا گیا ہے۔ اس مرض کی کیفیت یہ ہے کہ چپٹر مہینے میں خود بخود ملا کسی درو یا تکلیف کے رحم سے خون جاری ہو جاتا اور کثیر مقدار تک لگا رہتا ہے بند ہی ہو جاتا ہے چند دنوں یا مہینوں کے وقفہ سے پھر اسی طرح آپ ہی جاری ہو کر بند ہو جاتا ہے بعض مریضوں میں تو اس کثرت سے نکلتا ہے کہ فشی ہو کر ملاکت کا اندیشہ ہو جاتا ہے اور بعض میں خفیف مقدار میں نکلتا ہے اسی طرح پیدایش تک نکلتا رہتا ہو اگر اندام سنانی میں انگلی داخل کر کے رحم کے منہ کو ٹٹولا جاوے تو نرم سفیج کے مشابہ محسوس ہوتا ہے اور رحم کے اندر انگلی داخل کرنے سے آئول محسوس ہو سکتا ہے جس مایہ نے ایک دفعہ فی اقل کو خیال سے ٹٹول کر دیکھا ہو وہ پھر فوراً اسکو انگلی لگا کر پہچان سکتی ہے۔ اگر ساتوین مہینے سے پہلے جریان خون شروع ہو تو یہ دیکھنا چاہیئے کہ خفیف مقدار میں خون نکلتا ہو یا زیادہ مقدار میں۔ پس اگر خفیف مقدار میں خون نکلتا ہو تو اس کے روکنے کی کوشش کریں مدیضہ کو آرام سے چار بائی پر لٹائے رکھیں چلنا پھرنا قطعاً بند کریں اور پیڈ واداندام سنانی پر برت کی جیلیان باندھتے رہیں اگر اس سے خون بند ہو جاوے تو سات مہینے کے بعد تک انتظار کریں اور ساتوین مہینے کے بعد بچہ کو مصنوعی طور پر جزا الین کیونکہ جب ایک دفعہ بیلائی خون جاری ہوتا ہے تو ہمیشہ اسکا یہ خوف رہتا ہے کہ زیادہ مقدار میں دفعتاً ٹٹکر مان کو ہلاک کر دے اسلئے جس قدر جلدی ممکن ہو ساتوین مہینے کے بعد بچہ کو جزا الین ہی بہتر ہے اس میں مان کی بھی خیر ہے اور ساتوین مہینے کے بعد کا بچہ بھی زمرہ رہ سکتا ہے لیکن اگر خون زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے تو بچہ کے بچانے کی کوئی آرزو نہ کرنی چاہیئے بلکہ فوراً مصنوعی طور پر بچہ کا جزا الین ضرور ہے اسکی بہتر تدبیر حسب ذیل ہے۔ جہلیون کو بہار ٹکر اندام سنانی کے اندر سرکہ میں ترکی جولی

مل کی گدیان خوب ہوں کہ ہر دین اس سے خون بند ہو جائیگا اور رحم کو حرکت ہو کر پیدائش شروع ہو جائیگی۔ اگر اسطرح چہر خون بند ہو کر پیدائش شروع نہ ہو باری نیز میگ سے رحم کو کشا وہ کریں۔ سات آٹھ گھنٹہ میں رحم کا منہ کھلے گا جسے بعد ازاں مل کی گدیان بایگ کا لکر دیکھیں کہ خون بند ہو گیا ہے یا نہیں۔ پس اگر خون بند ہو گیا ہے اور رحم کا منہ ہی خوب کھلا ہے تو بچہ کو خود بخود پیدا ہونے دین لیکن اگر ابھی تک خون جاری ہو یا بچہ غیر معمولی صورت میں نکلتا ہے تو اسکو ہٹا کر باہر پس کے ساتھ پیدا کر لیں۔ مگر یہ تمام کام خاص ڈاکٹر کے ہاتھوں یا اس کی نگرانی سے ہی ہو سکتا ہے اسلئے ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر کو بلا لینا چاہیئے ورنہ زچہ ہلاک ہو جائیگی +

(۳) ولادت کے بعد کاجریان خون۔ اس سے ملزومہ جریان خون سے جو آئول کے نکلنے وقت یا اس سے پہلے جاری ہو یہ سخت خطرناک اور مہلک ہوتا ہے اگر اس کا فوراً انتظام نہ کیا جاوے تو یہ خون راوی کی طرح خارج ہو کر زچہ کو ایک دم میں ہلاک کر ڈالتا ہے اسلئے اس کا بڑا احتیاط کرنا چاہیئے اول تو پیدائش کو وقت پیٹ پر ہاتھ سے برابر دباؤ رکھیں تا وقتیکہ آئول خارج نہ ہو لے اور پیٹ پر خوب مضبوط ٹپکانہ باندھ دیا جاوے۔ دوم آئول کے نکلنے ہی دس رتی ارگٹ کا سفینا پانی کے ساتھ کھلا دینا چاہیئے۔ ان دونوں احتیاطوں کا ذکر ہم پہلے ہی باب پنجم پیدائش کو تیسرے درجہ کے انتظام میں مفصل درج کر چکے ہیں۔ اگر یہ دونوں احتیاط کئے جائیں تو اس مہلک جریان خون سے نجات ملاتی ہے۔ بالفرض اگر ایسا احتیاط نہیں کیا گیا اور خون جاری ہو رہا ہو تو دیکھو کہ چاہیئے کہ فوراً ہاتھ کو رحم کے اندر بیجا کر معلوم کرے کہ کوئی آئول کا ٹکڑا تو باقی نہیں اگر بالفرض کوئی آئول کا ٹکڑا باقی ہو تو اسکو نکال لے ہاتھ کے اندر جانے اور آئول کا ٹکڑا اٹھانے سے رحم زور کے ساتھ سکڑنا اور خون کو بند کر دینا جس سے ہاتھ ہی دس رتی ارگٹ کی پہنکی بھی پانی کے ساتھ دیدین اور پیٹ کو زور کے ساتھ دباوے کہہیں۔ اگر اب بھی خون بند نہ ہو تو دو بوتل پانی میں ایک اوٹس ٹنگو آئیوڈین ملا کر اسکی دہار رحم کے اندر پہنچا دین اس سے

رحم صاف ہو جائیگا اور خون ہی بند ہو جاوے گا یا روغن کہ دروئی کے پہا یون کے ساتھ رحم کے اندر لگا دین مگر یہ تمام تدابیر حیثیت پرست کرنی چاہئیں۔

اگر خون زیادہ غلغلہ مریضہ سخت ضعیف ہو گئی ہو تو قدر سے گرم دو دھ کیوڑہ ملا کر ملا دین اس عرصہ میں ہڈی کے ٹکڑے ہی بلا ہیمین تاکہ غذا خواستہ اگر کوئی خواب صورت ہو جاوے تو اسکی مدد کام آسکے زیادہ تفصیل کیلئے دیکھو مفید عام ہین پوسٹ پارٹم ہیموریج کا بیان۔

(۴) زچہ کا جرمین کا خون۔ اس سے مراد وہ جرمین خون ہے جو بچہ کی پیدائش سے چند گھنٹوں یا دنوں بعد واقعہ ہو۔ اگر زیادہ دیر میں بچہ پیدا ہو تو رحم کمزور ہو کر پورے زور سے نہیں سکڑتا اسوجہ سے بعد میں خون جاری ہو جاتا ہے اگر گدائی کی نادرانی سے رحم کے اندر آئول یا جلیون کے ٹکڑے یا خون کے چھپچھرے رہ جائیں اگر زچہ جلدی چلے پھرنے لگے یا رفق حاجت کے وقت زیادہ زور لگاوے یا اندر کوئی زخم آجائے تو ان اسباب سے ہی بعد میں خون جاری ہو جاتا ہے پس جیسا سبب ہو دیا علاج کرنا چاہیئے ہر حال میں مریضہ کو آرام سے ٹٹا کر رکھیں بیٹھنا کہڑے ہونا اور چلنا پھرنا قطعاً بند کر دین رحم کے اندر انگلی پہنچا کر دیکھیں اگر خون کے چھپچھرے یا آئول یا جلیون کے ٹکڑے موجود ہوں اونکو کاربانک لوشن کے ساتھ دھو کر صاف کر ڈالیں اگر رحم کے آگے یا پیچھے کیٹرن لگ گیا ہو اسکو شیک جگہ پر کر کے بیٹ پر چھکا باندھ دین اور دل رتی اگر کٹ کا صفحت تین دفعہ منہ نکھلائے رہیں کاربانک لوشن اور آئیوڈین لوشن بنا نیکی ترکیب پر سے کہ دو پوتل گرم پانی لیکر اوس میں دو تولہ کاربانک ایسڈ یا پتھر آئیوڈین مائلین۔ ایک ربڑ کی نیکی لولے کی ٹوٹی پر چڑھا کر اوسکے ذریعہ سے لوشن کی دھار رحم کے اندر پہنچا سکے ہین۔

(۵) آئول کا ٹکڑا رحم کے اندر رہنا۔ جب آئول کا ٹکڑا رحم کے اندر رہتا ہے تو پیدائش کے بعد میں درد اور تھارہتا ہے اور خون ہی جاری ہو جاتا ہے یہ مرض بھی دایون کی بیوقوفی سے پیدا ہوتا ہے اگر وہ تال کو پکڑ کر نہ کھینچیں اور آئول کے نکلنے کے وقت بیٹ کو خوب دبائے رہیں اور اگر پیدائش کے وقت کوئی ٹکڑا باقی رہ جاوے تو رحم کو ایک یا دو ماہوں میں ہیٹ کیٹرن سے

پکر کر نچوڑ کر صاف کر دیں۔ تو یہ مرض پیدا نہ ہو اسکا مفصل بیان ہم باب پنجم میں کر چکے ہیں۔ اگر رابہ کی نادانی یا کسی اندرونی سبب سے کوئی آنول کا ٹکڑا رہ جاوے تو رحم کے اندر ایک یا دو اونٹلیاں ڈال کر اونکو نکال دیں اور اگر کوئی ٹکڑہ رحم کے ساتھ پکڑا ہو تو انگلی کے کنارہ کے ساتھ اوسکو آہستہ آہستہ علیحدہ کر دیں۔ یہ خیال رکھیں کہ ناخون کی رگڑ سے رحم کی دیوار میں زخم ہو جائے بعد اکر نئے کے بعد اوسکو نکال لیں بعد ازاں کاریک نہ لوشن کی دھار سے رحم کو صاف کر دیں۔

(۵) رحم پٹ جانا۔ اگر نال کو کھینچا جاوے یا آنول نکالتے وقت رحم کو پیروہ طور سے زیادہ دیا جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رحم کی دیوار اندر کی طرف کو دب جاتی ہے اور کبھی سارا رحم پٹ کر اندر کی سطح باہر آجاتی ہے اس کی علامتیں یہ ہیں کہ خون برابر جاری رہتا ہے پیدائش کی قسم کا درد بار بار اٹھتا ہے اور رقیقہ جلد بہت ضعیف اور بڑا ہوتا ہے اور اندام نہانی کے اندر انگلی ڈالنے سے رحم پٹا ہوا معلوم ہو سکتا ہے اگر تمام رحم پٹ کر باہر آگیا ہو تو اندام نہانی کے اندر زیادہ انگلی بچاسکے گی رحم کا منہ معلوم نہ ہو سکے گا اور ایک نرم گولہ سا محسوس ہوگا۔

برعکس اسکے اگر تھوڑا سا حصہ اندر کو دب گیا ہے تو رحم کے اندر انگلی داخل کرنے سے ایک نرم گول اور ہار رحم کے اندر معلوم ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جھکھڑ گنڈ ہو پٹنے ہوئے رحم کو اندر کر دینے کی کوشش کریں ایک یا تہ اندام نہانی کے اندر داخل کریں اور دوسرا ہاتھ پیٹ پر رکھ کر پیٹ کی طرف دباؤ قائم رکھیں جو ہاتھ اندر داخل کیا جاتا ہو اس سے پٹنے ہوئے حصہ کو ناف کی طرف کو دبا دیں۔ مگر یہ عمل عرصہ کو بیہوش کر کے کیا جاسکتا ہے اگر تھوڑا سا حصہ اندر کی طرف پٹا ہے تو رحم کے اندر ایک یا دو انگلی داخل کر کے ناف کی طرف کو دباؤ دینا چاہیئے اگر آنول کا کوئی ٹکڑا پکڑا ہوا ہو تو جب تک رحم کا پٹنا ہوا حصہ اندر نہ ہو جائے اس وقت تک اوسکو توڑنا مناسب نہیں ورنہ خون جاری ہو کر اوسکا بند ہونا محال ہو جائیگا۔ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو صفحہ ۱۱۱ میں اور رش آمت پورس کا بیان۔

(۶) رحم کا پھٹ جانا۔ پیدائش کے وقت ضعیف شکاف رحم میں اکثر آجاتے ہیں جو خود بخود لپچھ

ہی ہو جاتے ہیں لیکن اگر زیادہ پھٹ جائے تو مرینہ بہت جلد سخت نڈ بال ہو کر جان طلب ہو جاتی ہے۔ درویشدہ ہوتا اور خون بکثرت جاری ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر کو بلوانا چاہیئے۔

۷۷ اندام نہانی یا سیون کے کسی حصہ میں زخم آجائے۔ انکے بارہ میں ہی ڈاکٹر سے رائے لیکر کام کرنا
۷۸ اندام نہانی کے قریب پیدائش کے وقت کوئی گچھٹکر خون جمے ہو جاتا۔ جب ایسا ہو تو فوراً ڈاکٹر کو بلوا کر مشورہ لینا چاہیئے۔

۹۹ زچہ کا بخار۔ یہ نہایت ہی مہلک اور متعدی بخار ہے جو عموماً دایہ کے میلے پھیلے ہاتھوں یا کپڑوں یا زچہ کے غلیظ کپڑوں یا بستر یا مکان سے پیدا ہوتا ہے جو بچہ کے جھننے کے بعد پانچ روز کے اندر یہ بخار شروع ہوتا اور وزات برابر شدت کے ساتھ رہتا ہے۔ اس ایک مہینے کے ساتھ اور صدمہ یا قسم کی تحلیلین شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ایک مہینہ تک ایک زچہ کو ہو جاوے تو بیویوں کو ہلاک کر ڈالتا ہے جو دایہ یا بخار دار اس زچہ کے پاس سے دوسری زچہ کے پاس جاسے تو اسکو بھی یہی بخار ہو جاتا ہے چونکہ یہ مرض خاص ڈاکٹر کے علاج کر نیکا ہے عوام الناس اس کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے اسلئے جب ایسا بخار ہو تو فوراً ڈاکٹر کو بلوانا چاہیئے زیادہ دیر گزرنے میں سخت اندیشہ ہو زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام مین زچہ کے امراض کا بیان۔

۱۰ پیٹھ کے اندر دم ہو جانا
۱۱ پیٹھ کے اندر پوٹا ہو جانا
۱۲ ٹانگ متوم ہو کر سفید ہو جانا
۱۳ زچہ کی دمکشی اور تشنج
۱۴ تشنج
۱۵ زچہ کا جنون
یہ تمام امراض زیادہ تفصیل طلب ہیں اور ڈاکٹر کی مشورہ کے بغیر انکا ٹھیک ٹھیک علاج ہونا محال ہے اسلئے سبیلان مرضوں کی علامات ظاہر ہونے فوراً ڈاکٹر کو بلوانا چاہیئے۔ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام مین زچہ کے امراض کا بیان۔

۱۶ پستان کے امراض۔ دیکھو مفید عام مین پستانوں کے امراض کا بیان۔

باب نہم بچہ کی حالت اور اوسکی حفاظت

بچہ کو پیدا ہونے سے تھوڑی دیر کے بعد سیاہ رنگ کا پتلا دست آتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو چار ماہہ اردنی کے تیل میں تھوڑا سا غنہ ملا کر بچہ کو انجلی کے ساتھ چٹا دین تاکہ پیٹ صاف ہو جاوے اگر بچہ کو جلدی دست نہ آوے تو سخت بیمار ہو جاتا ہے اسلئے ہمارے ملک میں یہ عام رواج ہو گیا ہے کہ بچہ کو پہلے گہلی دیتے ہیں۔ جس میں دستاویز چیزیں ہوتی ہیں یہ نہایت عمدہ رول ہے پہلے چار پانچ روز تک مان کا دودھ بھی دست آور دوا کا کام دیتا ہے اکثر بچوں کو مان کے دودھ سے ہی دست آ جاتا ہے اور کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی لیکن اگر مان کے دودھ سے دست نہ آوے تو ضرور چار ماہہ کی عمر تک میں تھوڑا سا شہد ملا کر بچہ کو چٹا دین اس سے کھل کر دست ہو جاوے گا اور پیٹ صاف ہو کر بیماری سے نجات مل جائیگی اگر کیسٹراکس موجود نہ ہو تو مفصل ذیل نسخہ دین برگ سنارم اشہ اجاویں ۴ رتی۔ پوست ہلیلہ ۲۰ روہ ماہہ ان سب چیزوں کو ۲ چٹا تک پانی میں بچا دین جب نصف کے قریب پانی رہیادے تو اوسکو چھان کر ایک تولہ مصری ملاوین اس میں سے ایک تولہ کے قریب کپڑے کی جٹی کے ساتھ چٹا دین۔

بچہ کے بدن کو روزانہ نیکر م پانی اور صابون کے ساتھ صاف رکھنا نہایت ضروری ہے گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے بھی نہلا سکتے ہیں کپڑے صاف اور خشک رکھنے چاہئیں سردی کے موسم میں غلاسن نہایت موزن ہے۔ یہ کپڑا ہلکا ہی ہوتا ہے اور گرم ہی۔ زیادہ موٹے طور و زلی کپڑے پہنانے سے بچہ کو تکلیف ہوتی ہے وراثتہ پاؤں اچھی طرح نہیں مار سکتا۔ سانس بھی رکنا ہے اور پسینہ بھی اچھی طرح صاف ہونے چاہئے اگر کچھ کمزور اور لاغر ہو تو نملائے کے پانی میں نمک ملا دینا مفید ہے اس سے بچہ کی طاقت بڑھتی اور جسم فربہ ہوتا ہے بچہ کو دن میں دو دفعہ روزانہ پاجانہ آنا چاہئے اگر اس میں فرق رہے یا ایک دن رات قبض رہے تو ماہہ کیسٹراکس میں تدریجاً شہد ملا کر چٹا دینا چاہیے اگر ہمیشہ میں ایک دفعہ ایسا کرتے رہیں تو بہتر ہے۔

بچہ کے واسطے پہلے چھ مہینوں میں مان کے دودھ کے برابر کوئی غذا نہیں ہوا اسلئے صحتی الامکان مان کا دودھ پلاوین اگر کسی وجہ سے مان کا دودھ رک جائے یا کم ہو جائے تو اسنڈی کے پتہ پانی میں

پکا کر انکے پانی سے ایک دفعہ روزانہ پستان کو دھونا اور بعد میں جب سات پتے گرم گرم پستان پر باندھنا دودھ کو جلدی اُتار دیتا ہے جب تک بچے کے سامنے کے چار دانت نہ نکل آویں اس وقت تک کوئی نشہ ستہ دالی چیز مثلاً ساگودانہ ارا روٹ چاول - حلوا - حریرہ - دال وغیرہ نہ دینی چاہیے جب تک دانت نہیں نکلے اس وقت تک بچہ مین کسی اناج کے ہضم کر نہ سکی قابلیت پیدا نہیں ہوتی -

اگر ماں کے دودھ پیدا نہ ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ماں بہت کمزور ہو تو مجبوراً اور قسم کا دودھ تجویز کر سکتے ہیں۔ ماں سے دیم درج پر دوسری عورت کا دودھ ہے جب دوسری عورت تجویز کریں تو معصلا ذیل امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ عورت ہر طرح سے صاف اور تندرست ہو اس کے بچے کی عمر قریباً قریب اس بچے کے برابر ہو اور اس کا بچہ ہر طرح سے تندرست اور قوی ہو۔ وہاں کی عمر پیش اور پیش ۳ سال کے درمیان ہو اس کو غذا عمدہ اور با ذرا کھلائی جاوے۔ ساتھ کام کاج کرتی رہے تاکہ چلنے پھرنے اور محنت سے اس کے فضلات خوب تحلیل ہوتے رہیں اور دودھ بھی صاف اور عمدہ رہے اگر دوسری عورت دودھ پلانے کے واسطے میسر نہ آئے تو کسی دھواں کا دودھ تجویز کر سکتے ہیں مگر دھواں کا دودھ سب سے زیادہ بچے کے موائج ہوتا ہو کیونکہ یہ عورت کے دودھ سے بہت ملتا جلتا ہے اگر گدھی کا دودھ بھی میسر نہ آسکے تو گائے کا دودھ دے سکتے ہیں۔ مگر گائے کا دودھ عورت کے دودھ کی نسبت بھدی ہوتا ہے اسلئے گائے کے دودھ میں برابر کا پانی ملا کر اور صاف بورہ سے بیٹھا کر کے پلانا چاہیے ورنہ ہضم نہ ہو گا۔ دودھ تازہ نکلا ہوا پلانا چاہیے باسی دودھ بچے کو ہضم نہیں ہو سکتا اسی بے احتیاطی سے اکثر بچے بیمار ہوتے ہیں۔ آگ پر ایک جوش دیکر پلانا بہتر ہے۔ دودھ پلانے کے برتنوں کو نہایت احتیاط سے صاف اور ستھر رکھنا چاہیے کیونکہ جب دودھ برتن میں کچھ لگا رہتا ہے تو ستر کر زہر جھاتا ہو اگر ایسے برتن میں بچہ کو دودھ پلایا جاوے گا تو سخت نقصان کرے گا۔ اند بچہ ضرور بیمار ہو جاوے گا دودھ پلانے کی بوتلون میں وہی بہتر ہے جسکے مُنہ پر صاف ریشمی چوچی ہو اور نلکی نہ ہو۔ کیونکہ نلکی کا ہر دفعہ صاف کرنا دشوار ہے خاص کر جب بے تیز عورتوں کے ہاتھ میں معمولی برتنوں کا صاف رہنا بھی دشوار ہوتا ہے تو شیخ نے اند ریشمی نلکی کا صاف رکھنا تو ناممکن ہے ہر دفعہ دودھ پلانے

کے بعد ربڑ کی چوچی اور بٹل کو گرم پانی کے ساتھ دھو دانا چاہیے یہی بے احتیاطی ہے جو غیر کا دودھ
پینے والے بچہ کو ہلاک کر ڈالتی ہے کہ انسی نزلہ گلے کا بیٹھ جانا۔ پیٹ کا درد۔ دست۔ نفخ اور بخار اکثر
اسی بے احتیاطی سے پیدا ہوتے ہیں۔

پلانے کے اوقات میں ہی بڑا احتیاط ضروری ہے۔ سخت نادانی ہے کہ بچہ کسے کھانے پیئے میں
وقت کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا خواہ دن میں بیس دفعہ پلاوین یا پچیس دفعہ یا کم و بیش اپنی طرف سے
کچھ عقل خرچ نہیں کی جاتی۔ جب بچہ رویہ چہاتی سے لگا لیا خواہ بہک سے روتا ہو خواہ پیٹ کی ثقالت
یاد دے بلکہ اکثر قویا ہوتا ہے کہ بچہ درد یا ثقالت سے رو رہا ہے اور نادان ماں اسکو زبردستی چہاتی
سے لگا لیتی ہے اس سے اس کا درد اور بوجہ اور زیادہ ہو جاتا ہے اور بچہ اسے معصوم کا پیٹ
اچھ کر دودھ چنگٹا محال ہو جاتا ہے تب عورتیں کہتی ہیں کہ اسکو اوپر ہی ہو گئی ہے سیالے کو بلانا چاہئے
کچھ تھان مار چکی تھی۔ اب باقی اندھ جان سیالے کی جھاڑ پونک کے قربان ہوتی ہے اگر کوئی سمجھاوے
کہ بچہ کا علاج کرنا چاہیے تو یہی جواب ملتا ہے کہ اس میں طبیب یا ڈاکٹر کا کیا کام ہے اسکو تو اوپر ہی
آسیب ہے۔ چہا بہ بچ گیا ہے۔ انسان کا مددہ گائے بکری کی طرح کا نہیں کہ تمام دن کھلاتے چلے
جائیں بلکہ اسکے معدہ کی ایسی ترکیب ہے کہ کھانے کے بعد اسکو ایک کافی وقفہ ضرور درکار ہے اگر پورا
وقفہ نہ ملے تو ضرور پیٹ کا خلل ہو جاتا ہے پہلا کھایا پیا ابھی ہضم نہیں ہوا کہ دوسرا آتا ہے۔ پس اسکا
نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پیٹ بھول جاتا۔ درد اور ٹھٹھا۔ دست لگاتے۔ قے بار بار ہوتی۔ جلد پر پوڑے پہنسی
بہت نکلے جسم لاغر ہوتا چٹا جاتا اور آخر کار بچہ ایک بڑیوں کا بیخیر بن جاتا ہے اور اسی حالت میں اول
و آخر زایل ہو جاتا ہے۔ اب ذیل میں ہم ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو جائیگا کہ کتنے
کتنے وقفہ سے اور کتنے مقدار میں بچہ کو دودھ پلانا چاہیے۔

کیمیائیات	دن رات میں کل کتب درود	فیروزہ کتب درود دیاجائے	دن میں کل کتب درود	کتنے کتب درود	ع
<p>رات کے وقت سوتے بچے یا بچوں کو جگانا من سب نہیں ان قوم انہما سے کا ایسا صاحب رکھتا ہے بچے کو رات کے وقت میں رات گھنٹے گزر گئے کے واسطے بچائیں۔</p>	<p>دورہ سہ پختہ تین پختہ سہ پختہ</p>	<p>چار تول چھ سات تول ٹوای پختہ</p>	<p>دس دفعہ دس دفعہ آٹھ دفعہ</p>	<p>دو گھنٹہ دو گھنٹہ توای گھنٹہ</p>	<p>پہلے پختہ میں تیسرا اور چوتھے بند میں اوپر پختہ سے ساتویں پختہ تک تیسرا پختہ چھٹا پختہ</p>

اگر ان یاد کا دودھ بچہ پیتا ہو تو اس میں ہی اسی طرح وقت کی پابندی رکھنی چاہیے غصہ فکر اور گمراہی کی حالت میں دودھ ناقص اور ٹرا اور بچہ کو نقصان کرتا ہو اس لئے ایسی حالت میں ہی پلانا مناسب نہیں ہمارے ملک میں یہ نہایت ہی کریمہ اور معرعات سے کہ رات کو کئی کئی بار بچہ کو دودھ دیتے بلکہ اکثر تو بچہ بامان کی چوچی کو منہ میں لئے سوجھ لے ہیں اور سولے سولے منٹے مار لے رہتے ہیں بچہ کا منہ سولے ہوئے عین پستان کے قریب ہوتا ہی جہاں ذرا چباتی پہلے منہ پہونچا اور اٹکھ کھلی تو اسی وقت چوگلتا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے دودھ عادت سے بچہ پرورش تو کیسے طبع پا نہیں سکتا بلکہ ہمیشہ کا مرض رہتا ہے جو کچھ پیتا ہو وہ ہضم نہیں ہوتا اور دستوں کی راہ نکلتا ہے اس سے پیٹ پھول جاتا اور جیم سوتا جاتا ہو جب تک بچہ کے کل دانت نہ نکل آویں اس وقت تک بچہ کو دودھ چنگھانا مناسب ہو چار ماہ کے دانت نکلنے کے بعد اندر دینا شروع کر سکتے ہیں پہلے اماروٹ اور ساگو دانہ سے شروع کریں جب آٹھ دس مہینے کا ہو جاوے تو چاول دیکھڑی دینی شروع کریں ایک سال کی عمر کے بعد روٹی کی عادت ٹالیں جب کھانے لگائے اس وقت کئی قسم کا احتیاط ضروری ہو۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو بہت دفعہ اور بہت ٹھوس ٹھوس کر کھلاتی ہیں اور ہوس کرتی ہیں کہ جلدی بڑھے مگر اس کا نتیجہ ہی ہوتا ہے کہ بچہ پیٹ کے خلل درو۔ اسہال۔ پیچش۔ قلع جلد ہر وغیرہ امراض میں مبتلا ہو کر چلتا لگتا ہے دن میں چار دفعہ سے زیادہ کھانا اور ایک دفعہ میں انداز سے زیادہ دینا سخت مضر اور ہلکے سے بچے پیٹ پر اور پہلون کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں بعض بچے مٹی کو ملے اور خاک بکشت کھانے لگاتے ہیں یہ حادثین تمام مضر ہیں تو طبی مقدار میں مٹھائی اور پکے ہوئے پہلون کا کچھ مصالحہ نہیں لیکن ان کی کثرت بہت نقصان کرتی ہو۔ مٹی اور رکھ سے تو قطعی پرہیز رکھنا چاہیے۔ پیٹ کے کیرے اٹھنا۔ اور پری اور نشان وغیرہ نام انہیں بیوقوفوں سے پیدا ہوتے ہیں۔

جب بچہ تین چار مہینے کا ہو جاوے تو ٹیکا لگوا دینا چاہیے اس سے چھک کا خطرناک مرض ٹکھتا ہو اگر بچہ چھک کے موسم میں پیدا ہو تو اس سے پہلے ہی ٹیکا لگادینا مناسب ہو چھک کا مرض عموماً پہاگن جیت میں ہوتا ہو اگر ان مہینوں میں یا اگلے قریب بچہ پیدا ہو تو ایک مہینہ کے اندر ہی اندر

ایک لگوا دین روشنی اور کہلی ہوا ہر حیران کی زندگی کیواسطے ضروری ہیں اسلئے جب بچہ پندرہ مہینے رور کا ہو جاوے تو اسکو تھوڑی دیر کے واسطے کہلی ہوا اور روشنی میں لیکر بچہ نہایت مفید ہو مگر مری سے بچاؤ رکھیں ہمارے ملک کی یہ بھی ایک اداسیت یہ کہ ہم ہر مہینوں بچہ کو جس بھی کے طور پر ایک کوٹھڑی میں بند رکھتے ہیں اور صاف ہوا اور روشنی کے عام نعمتوں سے اس بچہ کو کوئی حصہ نہیں دیتے ایک صحیح مندرست آدمی بھی دس روز ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیکھے کہ اس کے ہا حصہ اور دماغ کا کیا حال ہوتا ہے بچہ بچہ پر پھول سے بچہ کو کیوننا حق ننگ کیا جاتا ہے وہ پ مین زیادہ دیر تک رکھنا ضعف لاتا اور بدن کو کسماتا ہے برعکس اسکے مناسب و بیکار رکھنا نہایت مفید اور ضروری ہے۔ اگر بچہ کو خالص دودھ سہم نہ ہو سکے تو چونکہ پانی ملا کر پلانے سے ہضم ہو جاتا ہے چونکہ پانی بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ ایک سیر بچہ پانی میں ایک ٹولہ پتھر کا چونکہ ملا کر اور ایک بڑی بوتل میں ڈال کر رکھیں دس بار گھنٹہ میں صاف پانی اوپر رہا بیٹھلا اور تمام پھوٹ نیچے بیٹھ جائیگا۔ سات پانی کو نہ ہار کر دوسری بوتل میں رکھ چھوڑیں جب دودھ پلانا ہو تو اس میں پانچواں حصہ چونکہ پانی ملا کر اور میٹھا کر کے پلانے میں چھ دن پانی ملکر دودھ نہایت ہی لطیف اور سرلجہ الہضم ہو جاتا ہے۔ پھر بچہ کو کچھ خلل نہیں کرتا۔

بچہ کے چہرہ زبان باخانہ اور پیشاب پر ہمیشہ نظر رکھیں کیونکہ وہ بچہ ارشہ سے بولکر تو کچھ بتلا نہیں سکتا مگر ہشیار عورتیں چہرہ زبان اور باخانہ پیشاب کی کیفیت دیکھ کر اس کی صحت کا اندازہ کر سکتی اور قبل از وقت عیاری سے بچہ کو بچا سکتی ہیں اب ذیل میں مختصر بیان کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے کس طرح صحت کا اندازہ ہو سکتا ہے اور ادوا کیا انتظام ہے۔ صحت کی حالت میں بچہ کا چہرہ صاف رہتا ہے کسی جگہ کوئی بل نہیں ہوتا خوب اطینان کے ساتھ سوتا ہے اور سوتے سوتے مہین چومکتا لیکن اگر کوئی مرض موجود ہو یا صحت خراب ہو تو برعکس حال ہو جاتا ہے پیٹ کے خلل میں منہ کے قریب سر کی تکلیفوں میں انکھوں سے نیچے اور سینہ کے مضمون میں پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ بچہ سوتے سوتے دفعتاً چونک اٹھتا اور روئے لگتا ہے یا کبھی کبھی اچانک ابکی اُٹھ جاتی ہے پیٹ

کے خلل اور بخار میں زبان پر سفید کانٹے سے عجائبات ہیں۔ صحت کی حالت میں دست زرد رنگت کا
 ہوتا ہے اور کسی قسم کی اوسمین بدبو نہیں ہوتی لیکن اگر صفا کمر خارج ہو تو پاخانہ خشک سیاہی مائل اور
 بدبودار ہو جاتا ہے۔ پس اگر ان حالتوں میں سے کوئی حالت ہو یعنی چہرہ پر نمایاں ہون یا زبان پر سفید
 کانٹے سے نظر آئیں یا دست سیاہ بدبودار خارج ہو یا تھوڑا تھوڑا پاخانہ بار بار آئے یا قبض رہے تو فوراً
 چار چھ ماہ کیسٹر ایل میں تھوڑا سا شہد ملا کر چٹا دین اس سے دست با فراغت ہو کر تمام علامات صاف
 ہو جائیگی۔ اگر زیادہ قبض رہے تو دو مٹی سفوف حلابہ اور دو مٹی سفوف ریوند چلیں ملا کر ایسی ایک خوراک
 چہرہ مہینے کے بچہ کو دے اسکے مہین اس سے با فراغت صفائی ہو جائیگی۔ ہمیشہ کے قبض کے واسطے گندک
 نہایت مفید ہے چہرہ مہینے کے بچہ کو چار با چار رتی گندک ایک دفعہ روز کھلا سکتے ہیں جب پاخانہ نرم آنا
 شروع ہو جائے تو اس کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔ اگر بچہ کا پیشاب سرخ رنگت کا ہو تو سمجھنا چاہیے
 کہ پیٹ کا خلل ہو یا بخار شروع ہو یا لاہی تب بھی فوراً ایک حلابہ دیدیں جب بچہ کا ہاضمہ خراب ہوتا
 رہے تو اس کے پیشاب میں سفید تلچرٹ دیکھ جاتا ہے اس کا سب سے عمدہ علاج یہ ہے کہ مضمحلہ
 نسخہ تین دفعہ روزانہ پلائے رہیں۔ (۱) ایسڈ ہائیڈروکلورک ڈائیلیوٹ ۲ بوند۔ چرائیہ کا پانی ایک
 ڈرام۔ (۲) ایسڈ ٹائیٹرو ہائیڈروکلورک ڈائیلیوٹ ۲ بوند چرائیہ کا پانی ایک ڈرام ایسی تین خوراک
 روزانہ ان دو دواؤں مضمون میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں۔
 اگر بچہ سوتے وقت دانت کر دے اور دے اور پاخانہ کی جگہ کو بہت بے یا پیشاب کی جگہ کو
 بہت ملتا رہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کو پیٹ کا خلل ہو زیادہ مٹھائی یا بیہودہ خوشی لئے پیٹ میں خراش
 کر رکھی ہو۔ یا اس کے پیٹ میں چرلے ہیں جب یہ علامات ظاہر ہوں تو چار چھ ماہ کیسٹر ایل میں دس
 تا بیس کا تیل ملا کر پلا دینا چاہیے ایسا ہی عمل دو دو روز کے وقفہ سے تین چار دفعہ کریں حتی کہ
 چرلے صاف ہو کر تمام ظاہری علامات جاتی رہیں تک کہلانا چرلے کو روکتا ہے اس کے ایسی حالتیں
 نکلیں چیرین منہ کر کہلا دیں۔

باب دہم بچہ کے امراض اور ان کا علاج

بچوں کے تمام امراض کا ذکر اس مختصر رسالہ میں نہیں کیا جاسکتا اس باب میں ہم محض چند ایسے امراض کا ذکر کریں گے جو نہایت کثیر الوقوع ہیں اور جن سے اکثر بچے ہلاک ہوتے ہیں۔ اگر وقت پر ان کا مناسب علاج کر لیا جاوے تو وہ مرض دفع ہو جاتے ہیں ورنہ خراب ہو کر بچہ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں پھیٹ کا غل اچھارا۔ دست۔ کھانسی یا کھکھین دکھنا۔ یہ امراض نہایت کثرت سے دیکھنے میں آتے ہیں ان کے اسباب ذیل ہوتے ہیں۔

(۱) کھلانے پلانے کی لیے احتیاطی۔ بار بار کھلاتے رہنا۔ پہلا کھانا یا پیا ہی تک ہضم نہیں ہوا اور کھلا پلا۔ عسکہ اور گھبراہٹ کی حالت میں بچہ کو دودھ چکاھانا۔ باسی دودھ پلا دینا مٹی کو نہ اور خاک پلا کھلانے سے بچہ کا احتیاط کرنا۔

(۲) بچہ کے کپڑے اور بدن صاف اور خشک نہ رکھنا۔ ہنلانے اور کپڑے بدلنے میں مستغنی کرنا۔

(۳) غلیظ پروردار اندھیرے مکان میں بچہ کو بند رکھنا۔

(۴) مکان کے اندر نمی اور غلاظت موجود نہ رہنا۔

اگر ان اسباب کا دفع کیا جاوے اور صیغہ پہلا یا بون میں مفضل نہ لگایا بچہ ہوا کے مطابق انتظام رکھا جاوے تو تمام امراض رک سکتے ہیں اب ذیل میں ان امراض کا علاج مختصر مریج کیا جاتا ہے۔

(۱) پھیٹ کا غل۔ اس مرض میں بچہ اکثر دوتا رہتا ہے دودھ پینے یا چوگنے سے نفرت کرتا ہے چاروا دودھ اکثر ڈالتا اور درو کی آواز کے ساتھ روتا رہتا ہے۔ شروع میں چار چوہا شہ کیسٹراں پلا دین جب اس کو دوا درست ہو لین بعد ازاں سونف کا عرق تین پریشا خوراک میں تین دفعہ در پلاتے رہیں اگر دودھ خارجی پلا یا جاتا ہو تو اس میں بانچوان حصہ چوستے کا پانی ملا کر پلے رہیں۔

(۲) بچوں کا ایک خاص عمر کو پہنچ کر مریج۔ واجب ایسا معلوم ہو کہ ایک عورت کے دوا تین بچے ایک خاص عمر کو پہنچ کر مریجے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ اس عورت کے رحم کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ چہرے میں یا پس دن کا بچہ ہو کر مر جاتا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ عورت اپنے خاوند سے دیر

دو سال علیحدہ رہے اس عرصہ میں رحم کی پہلی عادت جاتی رہیگی۔ اور پھر حواطلا و ہونگی وہ جیتی رہیگی ایسا ہی متواتر عمل کر جائیگا علاج جو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا۔

(۱۳) اچھا رہا اس مرض میں پیشہ پڑ لکر انگلی مارنے سے ڈھول کی طرح بولتا ہے بچہ بہت رونا ترسنا اور دو دو ڈالنا ہے۔ سانس کھینچ کر آتا اور دودھ چوگنا اوسکے واسطے دشوار ہو جاتا ہے شروع میں ہماشتہ کیلٹر ایل مین وٹس بزنڈ تارپین کا ٹیل ملا کر پلاوین اور پیٹ پر آدھ آدھ گھنٹہ برابر تین دفعہ روزانہ تارپین کا سینک کریں اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایک دیگی پانی مین گرم کر کے اوس میں لالین کی دو ہری گدی تکرین اور خوب چمکڑا کر اوسکے ایک طرف بیٹس تیش نظر روغن تارپین کے ٹالین جسطرح روغن تارپین ڈالا گیا ہے وہ طرف بچے کے پیٹ پر رکھ دیں اسطر جسے بچے کے پیٹ کو سینک بھی ہو گا اور تارپین کی بہانپ بھی خوب لگیگی۔ گدی کو بار بار گرم پانی مین بیگو کر اور بچہ کر اور ہر دفعہ بیٹس تیش بوند تارپین ڈال کر پیٹ پر رکھئے ہیں۔ اسطر آدھ آدھ گھنٹہ تین دفعہ روزانہ سینک کریں۔ جبکہ کو دو چار دست آ لین تو اوسکے بعد ہی ایک دو بوند تارپین چہہ ماسٹہ عرق سوئف مین ملا کر کچھ کو دو دو گھنٹہ بعد پلاتے رہیں جب تک اچھا اور دور نہ ہو جاوے ایسا ہی عمل جاری رکھیں۔

(۱۴) کھانسی۔ بچہ مین کھانسی کا مرض نہایت مہلک ہوتا ہے کیونکہ اوسکے ہمہ پھٹے بہت ناک اور نرم ہوتے ہیں۔ بلغم کو خارج کرنے کے قابل نہیں ہوتے اسلئے بلغم اندر جمع ہو کر دیکشی پیدا کر دیتا ہے نیز جو بلغم کھانکے آنا ہو بچہ اوسکو کھنکھارے ساتھ باہر نہیں نکال سکتا بلکہ وہ تمام اندر ہی چلا جاتا ہے خفیف کھانسی کو تو آرام ہو جاتا ہے لیکن شدت کی کھانسی مین بچے اکثر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسلئے جب بچہ کو کھانسی ہو تو فوراً اوس کا باقاعدہ علاج کرنا چاہیئے۔ اول تو بچہ کو کم از کم ایک دفعہ روز قے کراتے رہیں اس ترکیب سے بلغم خارج ہو کر دیکشی دور ہو جائیگی دویم بچہ کو تین چار دفعہ روزانہ پانی کے بہانپ دیتے رہیں اس سے بلغم رقیق ہو کر آسانی سے نکلیگا اور بچہ کی دیکشی اور دودھ بھی آرام رہیگا۔

وائی نم اپیکاک بچ کی کہانسی کے لئے نہایت عمدہ دوا ہو اس سے تھے بھی ہو جاتی ہو اور بلغم
بہی خوب خارج ہوتا ہو آٹھ دنوں بعد وائی نم اپیکاک ۶ ماشہ عرق سولف مین ملا کر اسکو قدرے شہد سے
میٹھا کریں ۱۰ دیکھ کر پلاوین۔ اس سے تھے ہو کر بلغم صاف ہو جائیگا اگر ایک دفعہ پلانے سے بلغم صاف
نہ ہو تو دوبارہ چند دنوں کے بعد ایک اور خوراک پلا دیں۔ جب تھے ہو چکے تو بعد میں محض دو تین روزہ آخری
اپیکاک ۴ ماشہ عرق سولف اور قدرے شہد کے ساتھ ملا کر چار دفعہ روزانہ پلاتے رہیں دو تین روزہ
تھے تو نہیں ہوئی مگر بلغم خوب صاف ہوتا رہتا ہے صبح کی وقت ہر روز وہی آٹھ دنوں بعد کی خوراک پلا دو
کریں تاکہ روز تھے ہوئی رہے۔

ایک تنگ منہ کی بچہ مین ہانی اوبال کر اور بچہ کا منہ اوکے اوپر کر کے چار دفعہ روزانہ بہانپ دیتے
رہیں اس سے بھی خوب آرام ملتا ہو۔ پس جب دیکھو کہ بچہ میوش پڑا ہو اور دم کھینچ کر آتا ہو تو فوراً آٹھ
دنوں بعد وائی نم اپیکاک کے ساتھ تھے کر دو بلغم خارج ہو کر بچہ جو دل مین آ جا ئیگا اور سانس بھی ٹھیک
ہو جائیگا۔ اگر کہانسی پرانی ہو کر کچھ کمزور ہو جائے تو دو تین روزہ مچھلی کا تیل قدرے بے وعدہ مین ملا کر
دو دفعہ روزانہ پلانا چاہیئے اسکے بغیر پرانی کہانسی رفع نہوگی۔

(۵) دست بچوں کے دستوں کا علاج بڑی ہشامی اور سہجہ کے ساتھ کرنا چاہیئے بعض صورتیں تو ایسی
ہیں کہ ان مین فردا دستوں کا بند کرنا ضروری ہوتا ہو لیکن برعکس اسکے بعض صورتیں ایسی ہیں کہ
اون مین دفعتاً دست بند کر دینے سے سخت نقصان ہوتا ہو پس اول یہ دیکھنا چاہیئے کہ دستوں
مین میل آتا ہو یا نہیں اگر میل خارج ہوتا ہو تو خواہ دن مین کو آٹھ دنوں دفعہ ہی دست آتے ہوں اونکو
یکلنت بند کر نیکی کو شش نہ کر نی چاہیئے بلکہ شروع مین چار چھ ماشہ کیسٹر آیل پلا کر بیٹ کو صاف کرنا
بلکہ ان دستوں کے بند کر نیوالی دوا کہلاوین مثلاً مفصلہ ذیل نسخوں مین سے کوئی ایک نسخہ استعمال کریں
۱۰ دیکھ کر پلاوین ۲ رتی اندر جو ایک رتی۔ کھربامٹی ادھی رتی۔ ایسی تین پوڑیہ روزانہ پوڑیہ سے پانی مین
گھونگ پلانے رہیں۔

۱۲ دیکھ کر پلاوین ۲ رتی۔ اجو این ایک رتی۔ کھربامٹی ادھی رتی ایسی تین پوڑیہ روزانہ

(۳) سیلا طویا ایک رتی۔ گوند کیکر ۲۲ رتی۔ ان ہر دو کو باریک پیسکر ۲۲ حصوں میں تقسیم کر کے ۱۲۲ پوڑ میں بنار کہیں ایک ایک پوڑ میں تین دفعہ روزانہ سترہ رے سے شہداد اور پانی نیز ملا کر ملاپے تھریں بچو تاج مستور کو واسطے نہایت مفید ہو۔

(۴) کاسنگ ایک رتی تین چٹنگ ۲۲ قبا کلاب میں مل کر کے اوس میں ۲۰ بوند ڈائلیمیٹ نامی پیکر ایٹر ملا اوس میں پندرہ مینش رتی کسے قریب کیکر کا گوند اور ۴ ماشہ مندری ملا کر رملہ چوڑا اور آٹھ ماشہ خوراک میں تین چار دفعہ روزانہ پلاستے رہو۔ بچوں کے دست بند کرنے میں یہ دوا کیسر کا حکم رکھتی ہے۔

(۵) جب دستوں کا رنگ میلا اور بد بو بہت ہو تو پارہ اور کھربامٹی کا سفوف نہایت مفید ہو اس کے بنانے کی ترکیب یہ ہو کہ ایک تولہ پارہ اور ۲ تولہ صاف کھربامٹی ایک پتھر کی کھل میں ڈال کر تھر کے بیٹے کے ساتھ خوب رگڑو یہاں تک کہ پارہ کا کوئی ذرہ نظر نہ آئے اور تمام سفوف خاک کی طرح چریکسان ہو جاوے بعد ازاں ایک صاف خشک بوتل میں ڈال لگا کر کچھ چھوڑو۔ اس سفوف کی خوراک نصف رتی سے دو رتی تک ہو۔

(۶) چاک پاؤڈر کمپاؤنڈ بھی بچوں کے دستوں کے واسطے نہایت عمدہ دوا ہے۔ اگر دست خاکی رنگت کی اور بد بو دار آتے ہوں تو چاک پاؤڈر کے ساتھ پارہ اور کھربامٹی کا سفوف ملا کر دے سکتے ہیں چاک پاؤڈر بنا نیکی ترکیب باب دوم میں درج ہو چکی ہو پس دیکھو دیکھو۔ اسکی خوراک بچوں کے واسطے ایک رتی سے ۳ رتی تک ہو۔

(۷) آنکھ میں دھبہ اس کے اسباب عموماً حسب ذیل ہوتے ہیں مکان میں دھواں بد بو اور غمی کا رہنا۔

میلہ کچیلے ہاتھ یا کپڑے کا آنکھ پر لگانا بچہ کو پاک صاف نہ رکھنا۔ جب بچہ کی آنکھ میں دھبہ آجائے تو اسکا علاج بھی سوائے اسکے اور کچھ نہیں ہو کہ پچھلری یا بورک ایسڈ کے پانی سے آنکھوں کو بار بار دھو کر صاف رکھا جاوے اگر شروع میں یہ علاج نہ کیا جاوے تو آنکھ میں زیادہ وجہ جاتی ہے پڑ جاتی رہے جو جاتے پہلے پڑ جاتے اھا اکثر بچے اسی بے احتیاطی سے اندھے ہو جاتی ہیں۔ دوسرے غیظہ گرم پانی میں ایک تولہ پتھری یا چار تولہ بورک ایسڈ مل کر کے صاف بوتلون میں

دکھو۔ چہرہ میں جب ضرورت ہو آنکھوں کو انکے ساتھ خوب صحت کر کے اندر بھی پٹکا دیا
کرین تمام ادویہ کی مقدار جو اوپر بیان کی گئی ہو یہ ایک سال کے بچہ کی واسطے ہو اس۔ سب سے چھوٹی بڑی
عمر کے واسطے اندازاً لکھی پیش کر رہی ہے۔ دیگر امراض جو بچہ میں کثیر الوقوع ہیں ان کی تفصیل کی
اس جگہ گنجائش نہیں ہو اسلئے ہم ذیل میں ان کے نام درج کر کے مفید عام کے ناموں کا حوالہ درج کر دیتے

میں شائع ہیں اور اہل ضرورت اس جگہ ملاحظہ فرمائیں

قولنج - دیکھو مفید عام میں قولنج کا بیان -

قبض - دیکھو مفید عام میں قبض کا بیان -

قے - دیکھو مفید عام میں قے کا بیان -

پھنسی - دیکھو مفید عام میں پھنسی کا بیان -

مٹہ آنا - دیکھو مفید عام میں مٹہ سے نالی ش کا بیان -

ہڈی کا بد وضع ہونا - دیکھو مفید عام میں رکش کا بیان -

چنیل - دیکھو مفید عام میں انگریز کا بیان -

پیش - دیکھو مفید عام میں ڈسنٹری کا بیان -

پاخانہ کے ساتھ خون آنا - دیکھو مفید عام میں ملنیا کا بیان -

کالچ نکلنا - دیکھو مفید عام میں عروج المقعد کا بیان -

ہرے دست آنا - دیکھو مفید عام میں اسہال کا بیان -

دستوں میں آؤں بہت خارج ہونا - دیکھو مفید عام میں اسہال کا بیان -

پیٹ میں کیرے پڑنا - دیکھو مفید عام میں امٹھٹیل و رنز کا بیان -

انٹری کے اندر انٹری کا اوڑھنا - دیکھو مفید عام میں انٹس سپیشن کا بیان -

معدہ میں زخم ہو جانا - دیکھو مفید عام میں معدہ کے امراض کا بیان -

معدہ میں سفیدی ہو جانا یعنی پیوٹی لگنا - دیکھو مفید عام میں سڈومی نالی ش کا بیان -

مٹے گلجیا۔ دیکھو مفید عام میں سٹو میں ٹائیٹس کا بیان۔
 آتشک موروئی ہو جانا۔ دیکھو مفید عام میں آتشک کا بیان
 ہونٹھ میچ میں سے پٹار ہنا۔ کھنڈوا۔ دیکھو مفید عام میں ہیم لپ کا بیان
 گلا میٹھ جانا۔ دیکھو مفید عام میں فیکس کے امراض کا بیان
 گلے پڑ جانا۔ دیکھو مفید عام میں فیکس کے امراض کا بیان
 کو اگر جانا۔ دیکھو مفید عام میں سقاطا الہات کا بیان۔
 گلے میں پوڑا اڑ جانا۔ دیکھو مفید عام میں ریٹر و فیئر ہیل البیس کا بیان۔
 کان ہنا۔ دیکھو مفید عام میں انوریا کا بیان
 حنفیران یعنی خنازیر ہو جانا۔ دیکھو مفید عام میں سکرا نیولا کا بیان
 سناپ تلی ہو جانا۔ دیکھو مفید عام میں طیر یا کا بیان
 ناک سے بدبو آنا۔ دیکھو مفید عام میں اونڈینا کا بیان
 تسمیر۔ دیکھو مفید عام میں اپی سٹیکس کا بیان
 گہنڈی اگر اکروم خراثون کے ساتھ آتا۔ دیکھو مفید عام میں لیریکس کے امراض کا بیان۔
 پیچیک۔ دیکھو مفید عام میں کمال پاکس کا بیان

خسرو
 کنٹھی
 موتی جبار
 چولا

دیکھو مفید عام میں خسرو کا بیان

ٹائیفائیڈ بخار ہو جانا۔ دیکھو مفید عام میں ٹائیفائیڈ کا بیان
 ٹائیفس بخار ہو جانا۔ دیکھو مفید عام میں ٹائیفس کا بیان
 باب یازدہم نید الیش میں زاید دیر ہونا اور اوس کا علاج

پیدائش میں نایدیر جوڑنے کے وجوہات مختلف ہوتے ہیں ادا و کما علاج بھی مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے اسلئے پہلے نایدیر جوڑنے کا سبب دریافت کر کے اس کے مطابق علاج کرنا چاہیئے۔

اول۔ رحم کا ناقص اور بیقیا عدد طور پر حرکت کرنا۔ مثلاً اگر رحم بے طرح پڑا ہو یا بچہ کی جہلی میں پانی معمول سے زیادہ ہو۔ یا پیشاب یا پاخانہ بند ہو یا شکم وسیڈو کے اندر پانی جمع ہو یا کسی قسم کی رسولی ہو تو رحم پورے زور کے ساتھ نہیں سکڑتا اور پیدائش میں نایدیر جوڑ جاتی ہے اگر زچہ پر کسی قسم کا خون یا ترود غالب ہو تب بھی رحم اچھی طرح سے نہیں سکڑتا اور پیدائش میں دیر ہو جاتی ہے۔ پس اگر یہ معلوم ہو کہ قبض کی وجہ سے مقعد پر بے تکی وجہ سے رحم اچھی طرح کام نہیں کر سکتا تو حقنہ کر کے اسرار کو صاف کر دین بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ پیدائش سے ایک ہفتہ پیشتر کیسٹر ایل کا جلاب دیا جا یا کرے تو پیدائش کے وقت یہ وقت فاقہ نہ ہو۔

اگر پیشاب بند ہو تو تنگی کے ساتھ نکالنا چاہیئے اگر بچہ کی جہلی میں پانی معمول سے زیادہ ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ رحم کا منہ اچھی طرح کھل گیا ہو یا نہیں اگر رحم اچھی طرح کھل گیا ہو تو جلیوں کو نمک کی ڈلی یا ناخون کے ساتھ پہاڑ دین بعد ازاں بچہ جلدی پیدا ہو جائیگا لیکن اگر رحم کا منہ اچھی طرح سے نہیں کھلا تو اس کو مصنوعی طور پر اوٹھکیوں کے ساتھ کھول کر بعد میں جلیوں کو پہاڑ دین اگر رحم سائے کی طرف گر پڑا ہو تو مریضہ کو چت لٹا کر ٹیکا باندھ دین اگر رحم ایک طرف گر پڑا ہے تو مخالف سمت پر لٹا کر ٹیکا باندھ دین اگر سیٹ میں پانی جمع ہو تو پیدائش کے وقت سے پیشتر پانی نکلا دینا چاہیئے۔ ورنہ پیدائش کے وقت دقت ہوگی اگر صنعت رحم کا کوئی خاص سبب معلوم نہ ہو سکے تو مگرین سفوف ایپیکال پانی کیساتھ کھلا دین اس سے رحم کو بہت جلد طاقت آتی ہے اور رحم قدرتی طور پر پورے زور کے ساتھ حرکت کرنے لگ جاتا ہے کوئین مین بھی یہی تاثیر دیتا ہے کوئین پالی مین حل کر کے ایک خوراک پلا دین اگر ضرورت معلوم ہو تو ایک گھنٹہ کے بعد ایک اور خوراک ایپیکال یا کوئین کی دے سکتے ہیں پیدائش کے وقت ان اودیات کے دینے سے کسی قسم کا اندیشہ نہیں بلکہ ہر قسم کے فائدہ ہی فائدہ ہیں۔

پیدائش جلد بخانی اور بعد میں خواتین بھی خارج نہیں ہونی بلکہ رحم کامل طور پر صاف ہو جاتا ہے۔

اگر کبھی بھی کمرے زور کے ساتھ سیکڑتی ہو مگر جب تک آؤل باہر نہ جاوے اور کمرے میں
 دینا چاہیے اگر پہلے درجہ میں درجہ دے تو نابل الوقت جہلیان پیدہ کر تمام بانی خارج ہو جائیگا۔ پھر رحم کا
 دباؤ پھر پر کراد کے ہاتھ یا لون کو توڑ دینا اور زیادہ نگاہ اور دباؤ سے رحم اور اندام بھائی کو کبھی نقصان پہنچتا
 ہے بچے کے مرنے اور رحم کے پھٹ جانے تک کا اندیشہ ہو اگر دوسرے درجہ میں درجہ دے تب بھی بچہ
 اور بان کو سخت نقصان پہنچتا ہے اگر تیسرے درجہ میں درجہ دے تو آؤل کے ٹوٹ جانے اور اسکے
 کلرے اندر رہ جانے کا اندیشہ ہو کیونکہ اسکے دینے سے چند منٹ بعد رحم ایسے زور سے انقباض جاتا ہے
 کہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا اور رحم کا منہ بھی سخت اور تنگ ہو جاتا اور جیسی دباؤ سے بچہ اور آؤل کا باہر
 نکلنا تو دشوار ہو جاتا ہے مگر اندر رکھ کر دباؤ پر اس سخت دباؤ پڑتا ہے کہ ٹوٹنے پھوٹنے اور زخمی ہو جاتا ہے
 جسے ساتھ ہی رحم اور اندام کو بھی خطر پہنچتا ہے مگر ایک کاک اور کوئین اس قسم کے ضررات سے بالکل پاک
 ہیں کیونکہ اسکے دینے سے رحم بے وقت زور نہیں کرتا اور رحم کو نہیں کڑنا بلکہ برعکس اگر کمرے زور کا
 منہ خوب نرم اور شاہد ہو جاتا ہے اور رحم کو قدرتی حرکتیں باقاعداہ اور مضبوط ہو جاتی ہیں اس لئے
 انکو پیدائش کے ہر ایک درجہ میں دیکھتے ہیں مگر اگر کمرے کو محض آؤل خارج ہونے کے بعد دینا چاہیے
 تاکہ رحم خوب اچھی طرح سے سکڑ کر خون کامل طور پر بند ہو جاوے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر در وقت کا
 ہوتا ہے جسکو زور برداشت نہیں کر سکتی تو ایک رتی ایون کہلاوین یا بیٹس بیٹس گرین کلورل یا سیڈرٹ
 ایک چٹانک یا کمرے بانی میں گھول کر ملاوین اس سے تھوڑی دیر کے واسطے درد بند ہو جائیگا اور زچہ کو کچھ
 دیر آرام ملے مگر رحم دوبارہ اپنے پورے زور کے ساتھ حرکت کرنا شروع کرے گا اپنی ناک اور کوئین میں یہ بھی
 خوبی ہو کہ درد کو کم کر دیتے لیکن رحم کی طاقت کو زیادہ اور اسکی حرکتوں کو باقاعداہ کر دیتے ہیں پھر
 اگر ایک کاک یا کوئین پیدائش کے وقت کہلائی جائے یا گرین توہر حالت میں مغیبتا ہوگی ان سے نہ نقصان کسی قسم کا نہیں
 دوسرے پیدائش میں زیادہ دیر ہو سکتی ہے جو بات یہ ہو سکتی ہے کہ رحم کے اندر بااوس کے منہ کے منہ
 کوئی صولی ہو۔ یا رحم کے منہ میں لالہ ریشہ جکڑاؤ سکونہ لچن یا رحم کے منہ پر سر ملان پیدائشی چاہیے
 رحم کا منہ زیادہ ملنا اور لمبا ہو۔ یہ تمام صورتیں دائمی کے علاج سے باہر نہیں جب کوئی ایسی صورت

ہو تو فوراً ڈاکٹر کو بلا دیں۔ زیادہ تفصیل کیلئے دیکھو مفید عام مین عسر ولادت کا بیان۔

سوم۔ سنگ مثلاً اندام کے ورم یا رسولی یا نشی کی وجہ سے پیدائش میں زلدہ دیر ہوتا ان کا علاج ہی ڈاکٹر سے ہی ہو سکتا ہو۔ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام مین عسر ولادت کا بیان۔
چہارم۔ پیڈوکا پیدائشی طور پر تنگ یا بد وضع ہونا۔ اس کی تشخیص اور علاج ڈاکٹر کا کام ہے

فوراً ڈاکٹر کو بلا دیں۔ زیادہ تفصیل کیلئے دیکھو مفید عام مین عسر ولادت کا بیان۔

پنجم۔ خاصہ بچہ کی حالت میں عسر ولادت کا باعث ہو سکتی ہیں مثلاً بچہ کے سر میں پانی پڑ کر اور اسکو اس قدر ریڑا کر دے کہ اس کا سر پیڈوکے اندر اوڑنا محال ہو جاوے ایسی صورت میں جب تک سر کا پانی نہ نکالا جاوے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات پیڈوکے اندر بچہ کی تلی بڑھ جاتی ہے یا اس کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے یا پیٹ میں رسولی ہو جاتی ہے۔ تب ہی از خود پیدائش ہونی محال ہوا ایسے وقت میں ڈاکٹر کو فوراً بلا دیں زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام مین عسر ولادت کا بیان۔

ششم۔ ایک سے زیادہ بچوں کی پیدائش کے وقت واقع ہونا۔ عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایک بچہ سر یا پیڈوکے بل پیدا ہو کر دوسرے بچہ معمولی طور پر سر یا پیڈوکے طرف سے پیدا ہو جاتا ہے اور کچھ وقت نہیں ہوتی لیکن کبھی یہ وقت ہو جاتی ہے کہ دونوں بچوں کے سر یک لخت اوڑنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کی پیدائش میں باہر ہو جاتے ہیں۔

جب ایسا اتفاق ہو تو ایک بچہ کے سر کو اڈنگلیوں کے ساتھ راستہ سے ایک طرف کر دیں تب دوسرے کا سر نیچے خود بخود اوڑنا لے گا۔ اگر ضرورت پڑے تو فارسیس لگا کر کھینچ لیں۔ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام مین عسر ولادت کا بیان۔

مگر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ کا سر دوسرے کے گردن میں پھنس جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ کی ٹوڑی دوسرے کی ٹوڑی میں پھنس جاتی ہے۔ ایسا اتفاق ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ زیادہ تفصیل کیلئے دیکھو مفید عام مین عسر ولادت کا بیان۔

ہفتم۔ پیدائش کے وقت بچہ کا بے وضع ہو جانا۔ اس کا مفصل بیان باب ہفتم میں کیا جا چکا ہے

زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو مفید عام بین ورشن کا بیان۔

باب دوازدہم عورتوں کے دیگر امراض کی فہرست اور ان کے علاج کیطرون اشارات

آتشک و سوزاک۔ جقدر زنا کاری بکثرت ہوتی جاتی ہو۔ اسی قدر یہ مرض زیادہ عام ہوتا جاتا ہے مرد و نکو تو یہ مرض اپنی بدکاریوں کے نتیجہ میں ملتا ہے لیکن اون مردوں کے طغیل سے بہت سی باعصمت پردہ نشین عورتیں ہی مبتلا ہوتی ہیں پر زیادہ مصیبت یہ ہے کہ عورتوں کی حیا اس مرض کی تمام مصیبت اور ٹھکانا اور مرنا تو گولا کرتی ہیں لیکن اس مرض کا صاف صاف ظاہر کرتا قبول نہیں کرتیں جس کی وجہ سے خود سخت مصیبتیں اڑھاتی اور ان کی بے خبری اور بے احتیاطی کی وجہ سے چوہے چوہے بچوں کو بھی یہ مرض لگتا ہے جب ایک کنبہ میں ایک مرد یا عورت کو آتشک ہو جائے تو اس کے احتیاطوں کی بے خبری سے بہت سے بیگناہ ہی مبتلا ہو جاتے ہیں اس لئے اس کا مفصل حال پچھنے مفید عام اور رسالہ اعصاب مخصوصہ میں درج کیا ہے تاکہ درپردہ خود مرد و عورت اس مرض سے حفاظت کر سکیں اور بروقت علاج ہی کر لیا کریں دیکھو مفید عام بار سالہ اعصاب مخصوصہ میں آتشک و سوزاک کا بیان۔ پیشاب کا بندھ جانا۔ حیض درد کے ساتھ خارج ہونا۔ حیض میں زیادہ خون آنا۔ حیض کے متعلق دیگر امراض۔ شراب کے نقصانات اور شراب کے امراض۔ صنعت ماہ۔ حیض بند رہنا۔ سفیدی کا آنا۔ جریان۔ عورت کا باجھہ رہنا۔ باجھہ پن کے کیا کیا اسباب ہیں اور ان میں سے کون کونسی حالتیں قابل علاج ہیں اور کونسی نہیں ہیں۔ پیشاب کا بار بار بے اختیار خارج ہونا۔ کثرت استقاط۔

یہ تمام امراض اس قسم کے ہیں کہ مستورات ان کا صاف بیان کرنا کبھی گولیا نہیں کرتیں اور بڑی تکلیفیں اڑھاتی ہیں اس لئے ان تمام امراض کا علاج ایک علیحدہ رسالہ میں جس کا نام رسالہ اعصاب مخصوصہ ہے درج کر دیا گیا ہے جو ہر گز میں ہمیشہ موجود رہنا چاہیے تاکہ وقت پر فورا کا رآمد ہو سکے۔ مفصلہ بالا امراض کے علاوہ دیگر تمام امراض رحم اور انٹین کے متعلق مفید عام میں لغت

کی ترتیب پر درج ہیں جس مرض کا حال دیکھتا ہو اس میں فوراً لغات کے طور پر لکھ دیکھ سکتے ہیں
تمام کچن اور مردوں کے ہر قسم کے امراض اس میں درج ہیں اور تمام دیسی اور انگریزی دوائیں
ہر درج میں جس مرض یا دوا کا حال دیکھتا ہو تو جیسے لغات میں لفظ دیکھتے ہیں ویسے ہی اس میں
لکھا اور دیکھ لو۔

فوطی جن صاحبان کی خدمت میں یہ رسالہ پہنچے وہ براہ مہربانی ۲۰۳۰ کے ٹکٹ اسکی قیمت
اور محصول کی بابت بشرط پندرہ روپے ڈاک ارسال فرمائیں۔ اہل ثروت لوگ اس کی بہت بہت جلدیں
خرید فرما کر اپنے عزیزوں اور دوستوں میں مفت تقسیم فرمائیں۔ یہ ایک بڑی عمدہ دی اور نواب کا کام
ہو گا کیونکہ جو خزانہیں چھنے اس رسالہ میں بیان کی ہیں وہ عالم گیر ہیں اور باہر عالم شہرت کے اور کمال
دفعہ بحال ہو چکے ہیں اس کی پانچ جلدیں مفت اپنے عزیزوں اور احباب میں تقسیم کی ہیں۔

مفید عام کی نسبت صد ہائے تخریفی سادات میں سے چند کا خلاصہ

۱۔ خلاصہ رائے نقد کثرت کرکل ڈاکٹر چارلس ٹیٹیاہارن صاحب یہودی ایم بی سی آئی ای مفید عام نہایت ہی مفید کتاب ہے صاحب صریح لکھتے ہیں کہ تمام طبقات خجالت ریزہ سب پشاور میں افادہ عام اور دل افزائی مصنف کی مرضی سے تفسیر فرمائی اس قدر لائق اسد اللہ انسانی کا مصنف نہایت ہی شکر گزار ہو۔

۲۔ ترجمہ چوٹی عام نمبر ۸۶ مورخہ ۱۱۱۱ھ کے مشتمل اور جانب سرحد کرکل اسی سے۔ انسپکٹر جنرل شفا خان خجالت سولی پنجاب شہلک صاحبان سولی سرحد پنجاب

صاحبان۔ اس سلسلہ میں خیر علی خان ایم۔ بی نے ایک کتاب مفید عام نام مصنفیت کی اور میں نے بالکے ساتھ اس کتاب کی بابہ ایک واسطے عرض کیا ہے جو کہ اگر سرحدی لاہور میں ایک اسکول سے حاصل کیا گیا ہو۔ اس سے ظاہر ہو کہ یہ مصنفیت سرحدی کے لائق ہو اور اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو اس پیش اسٹنٹوں کی واسطے کوئل باؤنیک کی معرفت چند نسخے خرید فرمائیں۔ خلاصہ چوٹی صاحبان کے سرحدی اسکول ناہور۔

یہ مصنفیت باپش اسٹنٹوں اور پھر ان کے واسطے یقیناً مفید ہوگی اس کی عبارت سلیس اور عام فہم ہے۔ یہ نانی کے مطابق ہی دیکھ کر علاج درج کیا گیا ہے جس سے مصنف کے کام پر مصنف کی مزید دل فرمائی ہوئی ہے۔ اس چوٹی کے بعد جب ذیل کتب شفا خان خجالت اور میں نے سبیل کمیٹیوں کے واسطے خریدی جا چکی ہیں اسے سولی صاحبان بہار میں کثیر طبع راہ لہنڈی، جلدین ۲، راہی ہرادیہ سوت رائے صاحبان سولی سرحد مظفر گڑھ ۶ جلدین ۳، کپٹن اسے سی بارون صاحب ڈیپٹی کمشنر ضلع گجرات ۱۰ جلدین ۴، سرحد کپٹن ڈی بی ایچ صاحب سولی سرحد ضلع گجرات ۱۱ جلدین ۵، سرحد کپٹن ایچ ایم ورس صاحب سولی سرحد فیروز پور ۶ جلدین ۶، سرحد کپٹن جان لوہی صاحب سولی سرحد بنوان پنج جلدین ۷، سولی سرحد حصار ۸ جلدین ۹، مصنفان کا نام سولی سرحد گزار ہو۔

۳۔ خلاصہ رائے ڈاکٹر اسکات صاحب ایم بی۔ میں سے دل سواس بات کا اکثر کرتا ہوں کہ میں نے ایسی کتاب اور دوا انگلیزی میں آج تک نہیں دیکھی جو ہر دور کے خواص اور امراض کا علاج اس کمال اور خوبی کے ساتھ بیان کرے یہ کتاب ایسی جامع اور ایسی قابل اعتبار اور ایسی مفید ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں پاسکتی ایک ایک جلد ہر گھر میں ہونی چاہیے۔

۴۔ خلاصہ رائے حکیم رحیم اللہ صاحب حکیم پشاور۔ مفید عام ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور نہایت ہی مفید اور ایک ایسی کتاب جو ہر ایک مرض کا نام ہر زبان میں مد علاج مفصل و مدلل طرح کی گیا ہو۔ میں نے اس کی مدد سے بہت سی بیماریاں کوئی اس کی نظیر نہیں دیکھی کہ اس کی ایک جلد ہر گھر میں ہونی چاہیے۔

۵۔ اسید ہر کہ باپش اسٹنٹوں کی دوا سٹون پر باقیانہ اصطلاع میں ہی مفید عام خرید کر شفا خان خجالت کی

اسماء

عروجیہ اب تمام تعلیم یافتوں کے واسطے نہایت ہی ضروری اور مفید کتابیں

۱۱) مفید علم و معرفت الحکیم کہ ایک لغات اندیہ و علمی میں عرض لورڈ کا نام انگریزی اردو فارسی اور عربی زبان میں لغات کی ترتیب پر درج کیا گیا ہے جس میں اردو کا اعلیٰ معلوم کرنا اور دیگر لغات کے طور پر

کھاوا اور دیکھ لو۔ خواہ او کا نام کچھ آئندہ زبان میں آنا پھر وہاں کسی اور لفظ اگر میرا میں۔ اسکی مدد سے خود کمال
 معلوم پر علاج کر سکتے ہو یا کم از کم کسی خاص نسخہ و مسالہ کی حاجت پڑے تا بل اور قابل اشفاق اور افسوس میں جب چاہو

کمال رائے حاصل کر سکو یہ مرض کے علاج میں انگریزی و یونانی نسخات جو اعلیٰ درجہ پر قابل اعتبار ہیں
 جمع کئے گئے ہیں سہل الوصول اندوہی لادویہ کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے تاکہ اس کی مدد سے شہر و دیہات

مین علاج ملا وقت ہو کر پورے اوروں ہی علم کیلئے یہ کتاب حالت صحت میں برقی ماغزوئی اسرار نامہ صحت
میں موش نگہ ساز ہوگا اسکے تتمہ میں اخلاقی اور روحانی لغراض کا علاج ملایا ہے اور اس پر اور معقول

[illegible]

اور طرح طرح کے اختیارات کو بشمول نقدین کا استعمال ہرگز استعمال نہ کرے اور جو نقدی اشیاء قبضہ میں ہوگی ان کا استعمال نہ کرے۔ اس میں خواہاں کے لئے غنائم اور غنائم کے دیگر قوانین جاری ہوں گے۔

۱۲۔ اگر کسی نے یہ فیوض کلامیہ کی تعلیم حاصل کر لی ہو تو اس کا سر پہ

تاج لگا کر ان کے دربار میں مقرب و مقربان کے عرش میں موجود ولی خواجے بیست ۱۲

حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص بندہ بنالیا کرتا ہے۔

مناہین انہیں کہ فریبہ ہر دین غیر قائم اور بے جا ہے۔ انہیں اس کے طریق کے متعلق ہیں ورج کے
کے ہیں اور انہوں نے کہ تمام طریقوں میں انہوں نے ان کا اس میں کامل طریق اور نسبت ۸

المشعر ما كرهوا فيه فانهم لم يمسكوا من غير ان يمشوا فيه فانه لا يمشون

